

ACERDIL®

10 MG



PRODUCTO

Nombre	ACERDIL COMPRIMIDOS 10 MG
Principio Activo	Lisinopril
Excipientes	Almidón glicolato de sodio, celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, estearato de magnesio y talco.
Registro Isp	F-5654
Fecha de Aprobación	26-09-1988
Equivalencia Terapéutica	
Vías de Administración	Oral
Periodo de Eficacia	24 meses
Periodo de Estabilidad Refrigerada	N/A
Periodo de Estabilidad Temp. Ambiente En Envase Primario	24 Meses

ENVASE

Condiciones de Almacenamiento	Almacenado a no más de 30°C
Unidad de Medida	Comprimidos

Envase Primario

Blister pack compuesto por lámina de PVC - ámbar termoformado y sellado con film de aluminio impreso.

Envase Secundario

Estuche de cartulina impreso.

FABRICANTES

Principios Activos/ Gmp Api

ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO

Fabricante / Gmp Planta/ Pt

LABORATORIOS RECALCINE S.A.

Distribuidor / Gmp Planta

LABORATORIOS RECALCINE S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

ACCIÓN TERAPEUTICA

Antihipertensivo

INDICACIONES

Hipertensión esencial.
Hipertensión renovascular.
Insuficiencia cardíaca congestiva.

POSOLOGÍA

Hipertensión arterial: La dosis inicial comúnmente recomendada es de 10 mg. La dosis de mantenimiento generalmente es de 20 mg administrada en una sola toma diaria. La posología debe ser ajustada por el médico según la respuesta al tratamiento.

Hipertensión asociada con insuficiencia renal: La dosis será ajustada por el médico de acuerdo a valores de clearance de creatinina.

Insuficiencia cardíaca congestiva: En pacientes con insuficiencia cardíaca, la dosis inicial debe ser administrada bajo observación médica, especialmente en aquellos pacientes con presión arterial baja (presión sistólica menor a 100 mm Hg).

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad al lisinopril o a cualquier otro componente de la formulación.
Embarazo y lactancia.

CERTIFICACIONES

Autoridad
Regulatoria de
Países de Alta
Vigilancia