

ARADIX

ABBOTT

Estimulante del SNC.

Composición.

Cada comprimido contiene: metilfenidato 10mg.

Indicaciones.

En niños como coadyuvante en el tratamiento de trastornos por déficit de atención con hiperactividad, que incluye medidas sociales, educativas y psicológicas. Tratamiento de los síntomas de la narcolepsia.

Dosificación.

Vía de administración: oral. A pesar de que la dosis debe ser individualizada de acuerdo a las necesidades y respuesta de cada paciente, se puede recomendar el siguiente esquema posológico: *Trastornos de déficit atencional con hiperactividad:* Niños mayores de 6 años: Administración oral de 5 mg dos veces al día, durante o después del desayuno y almuerzo. La dosis puede ser aumentada en 5 a 10 mg de acuerdo a la respuesta y tolerancia del paciente, dejando pasar una semana entre cada incremento y sin sobrepasar la dosis de 60 mg diarios. *Adultos y adolescentes:* Tanto para tratamiento de los síntomas de narcolepsia como de trastornos por déficit atencional con hiperactividad, se recomienda de 5 a 20 mg dos a tres veces al día preferentemente con o después de los alimentos. No se debe sobrepasar la dosis de 90 mg diarios. Para ambos grupos etarios, si luego de realizar los ajustes de dosis no se observa mejoría después de un mes de tratamiento, se recomienda discontinuar este medicamento.

Presentación.

Env. con 30 comprimidos.

