

# Finartrit Glucosamina 500 mg 60 Comprimidos









## Finartrit Glucosamina 500 mg 60 Comprimidos

Antiartrósico, coadyuvante en el tratamiento de artrosis leve a moderada.

#### **Beneficios**

Finartrit es un antiartrósico a base de Glucosamina y Condroitina, la fórmula más utilizada a nivel mundial para el tratamiento de la artrosis. Ambas sustancias tienen efectos terapéuticos beneficiosos para la salud, y actúan como un eficaz tratamiento para la artrosis.

## Principales principios activos

- Glucosamina.
- Condroitina.

#### ¿Para qué enfermedades o condiciones se recomienda este medicamento?

Glucosamina + condroitina se recomienda, junto con otras medidas, para tratar la artrosis (también conocida como osteoartritis), una condición que se caracteriza por el desgaste del cartílago de las articulaciones y que se acompaña de dolor, inflamación y disminución del movimiento.

#### ¿Este medicamento requiere receta médica?

No, la asociación de glucosamina con condroitina es segura y su uso no requiere indicación médica. Sin embargo, si usted presenta síntomas de artrosis es recomendable que consulte a su médico quien evaluará su condición y le indicará el tratamiento más adecuado a su caso particular.

### ¿Cómo debo usar este producto?

La dosis recomendada es: Presentaciones comprimidos o cápsulas 500/400 mg: 1 tableta, 3 veces al día junto a las comidas. Presentaciones sobres 1500/1200 mg: 1 sobre al día, junto a la comida. Debe disolver el contenido del sobre en un vaso de agua.

# ¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Dentro de sus efectos adversos se encuentran: dolor de cabeza, náuseas, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, entre otros.

#### Presentación

Este medicamento se presenta en forma de comprimidos o sobres.

#### Modo de almacenamiento

Este medicamento se debe almacenar a temperatura ambiente (no más de 25°C) y protegido de la luz. No requiere refrigeración.

# ¿Cuántos miligramos de Glucosamina debo tomar al día?

Si decide probar estos suplementos, los expertos recomiendan tomar la cantidad utilizada en la mayoría de los estudios clínicos: Glucosamina: cápsulas, tabletas, líquido o polvo, 1,500 mg (miligramos) al día.