



FICHA TÉCNICA PRODUCTO FARMACÉUTICO

HIDRASAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg

Código PT: 500569

Versión: 01

Página 1 de 2

N° Registro	Chile	País	País
	F-27524	N/A	N/A
Nombre	HIDRASAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg		
Forma farmacéutica	Comprimidos recubiertos		
Principio activo	Rivaroxabán		
Grupo terapéutico	Anti Trombótico		
Código ATC	B01AF01		
Equivalencia terapéutica	Chile		
	Bioequivalente		
Vía de administración	ORAL		
Indicación terapéutica	Chile		
	Rivaroxabán está indicado para la prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes sometidos a una intervención quirúrgica ortopédica mayor de las extremidades inferiores. tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), y la prevención de la TVP recurrente y la EP en adultos.		
Dosis y administración	El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. no obstante, la dosis usual recomendada es:		
	• Para prevenir la formación de coágulos de sangre en las venas después de una operación de sustitución de cadera o rodilla: la dosis recomendada es un comprimido recubierto de 10 mg una vez al día • Para tratar los coágulos de sangre en las venas de las piernas y en los vasos sanguíneos de los pulmones, y para prevenir que los coágulos de sangre vuelvan a producirse. Después de por lo menos 6 meses de tratamiento de los coágulos de sangre, la dosis recomendada es un comprimido recubierto de 10 mg una vez al día o un comprimido de 20 mg una vez al día. traque el comprimido recubierto, preferentemente con agua. Si tiene dificultad para tragar el comprimido recubierto entero, consulte a su médico sobre otras formas de tomar Hidrasan® comprimidos recubiertos 10 mg. Trate de tomar un comprimido a la misma hora cada día, para ayudarlo a recordarlo. el médico decidirá durante cuánto tiempo debe seguir tomando el tratamiento. Para prevenir la formación de coágulos de sangre en las venas después de una operación de sustitución de cadera o rodilla: Tome el primer comprimido 6 a 10 horas después de la operación. Si se ha sometido a una cirugía mayor de cadera, generalmente tomará comprimidos durante 5 semanas. Si se ha sometido a una cirugía mayor de rodilla, generalmente tomará comprimidos durante 2 semanas. Si olvido tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. tome el siguiente comprimido al día siguiente y, después, siga tomando un comprimido cada día, como de costumbre. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. No interrumpa el tratamiento con Hidrasan® comprimidos recubiertos 10 mg sin hablar primero con su médico, porque rivaroxabán previene el desarrollo de una afección grave. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.		



	FICHA TÉCNICA PRODUCTO FARMACÉUTICO	
HIDRASAN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 mg		
Código PT: 500569	Versión: 01	Página 2 de 2

Período de eficacia	Chile
	24 meses
Condición Almacenamiento	Chile
	Almacenar en lugar fresco y seco a no más de 30°C.
Descripción Envase	Envase de cartón impreso debidamente sellado lo que asegura inviolabilidad de contenido, conteniendo blíster de PVC / Aluminio impreso.
Presentaciones	14 comprimidos recubiertos.
Imagen producto terminado (referencial Chile)	

ELABORADO POR: ANALISTA GESTOR PIPELINE SENIOR Elizabeth Castro Olivares DocuSigned by:  286BB3ECC91F415... Fecha: 08-04-2024	REVISADO POR: JEFA AARR INTERNACIONAL Katherine Quevedo Leiva DocuSigned by:  C6D31E542100465... Fecha: 08-04-2024	REVISADO POR: JEFA AARR NACIONAL Ana Cifuentes Retamal DocuSigned by:  FB006B2F0BFA4A0... Fecha: 08-04-2024	AUTORIZADO POR: GERENTA ASUNTOS REGULATORIOS Cynthia Peralta Medina DocuSigned by:  94A93A668AE9421... Fecha: 08-04-2024
--	---	--	---

