

FOLLETO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL

Accualaxan polvo para solución oral

NOMBRE DEL PRODUCTO

Accualaxan polvo para solución oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Laxante de acción osmótica.

INDICACIONES Y USOS

Se indica como laxante en el tratamiento del estreñimiento ocasional.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN

Cada sobre contiene:

Macrogol 3350.....17 g

Frasco

Cada 100 g contiene:

Macrogol 3350.....100 300 g

DESCRIPCIÓN

El Macrogol 3350 es un polímero lineal de óxido de etileno.

El Macrogol 3350 es agente osmótico que, debido a su estructura, induce la retención de agua por la materia fecal, con lo cual ésta aumenta su volumen, reblandeciendo su consistencia y facilitando su eliminación.

FARMACOCINÉTICA

El ~~Polietilenglicol~~ **macrogol** 3350 no se altera a lo largo del intestino. ~~Realmente~~ no se absorbe por el tracto gastrointestinal (debido a su elevado peso molecular) y no tiene actividad farmacológica conocida. En caso que se absorbiera, se excretaría por vía urinaria.

Cuando se usa como tratamiento del estreñimiento, la respuesta inicial se produce al cabo de 2-4 días.

No se ha demostrado que ~~Macrogol~~ **macrogol** 3350 tenga algún efecto sobre la absorción activa y la secreción de glucosa o electrolitos. ~~No produce taquifilaxia.~~



FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL

Accualaxan polvo para solución oral

POSOLOGIA

Se administra vía oral.

Dosis habitual en adultos y adolescentes mayores de 17 años de edad:

La dosis recomendada de Macrogol 3350 para el estreñimiento es de 17 g de polvo un vez al día durante 7 días como máximo.

No se recomienda en niños y adolescentes menores de 17 años

MODO DE USO

El contenido de un sobre de Macrogol 3350 debe ser disuelto en 200 mL de agua hervida o purificada, jugo, bebida, café o té.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El uso frecuente y prolongado de este laxante u otro puede crear hábito.

Los pacientes con estreñimiento deben ser evaluados con una historia clínica detallada que incluya un examen físico completo para evaluar las condiciones metabólicas, endocrinas y neurológicas asociadas, así como la medicación concomitante que estén tomando y que pudiera contribuir o agravar la constipación. En algunos pacientes será importante realizar un estudio radiológico o endoscópico del colon.

Debe evitarse el uso de Accualaxan polvo para solución oral en pacientes con síntomas ~~suggerentes~~ de obstrucción intestinal como: náuseas, vómitos, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales. Además se aconseja no usar este producto en caso de fiebre.

Los pacientes deben ser informados sobre hábitos alimenticios y defecatorios adecuados (como dietas con alto contenido de fibra) y cambios del estilo de vida (ingesta adecuada de líquidos y ejercicio regular) con el objetivo de mejorar el funcionamiento intestinal.

El uso frecuente, prolongado o excesivo de Accualaxan polvo para solución oral, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes.

La acción de los laxantes en pacientes con historia clínica de constipación puede ~~no ser inmediata y~~ requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Se desconoce si Macrogol 3350 puede causar daño fetal cuando es administrado durante el embarazo o que afecte la capacidad reproductiva. Dado que el Macrogol 3350 prácticamente no se absorbe en el intestino, su empleo durante el embarazo ~~o en el periodo de lactancia queda a juicio de~~ debe decidirlo el médico de acuerdo a las condiciones de la paciente. La prescripción de este medicamento en mujeres durante la lactancia puede ser una opción en caso de necesidad.

Geriatría: se debe usar con precaución en los pacientes de edad avanzada. En caso que se produzca diarrea se debe suspender el tratamiento.

CARCINOGENICIDAD, MUTAGENICIDAD Y FERTILIDAD

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN PROFESIONAL
Accualaxan polvo para solución oral

No hay estudios de carcinogenicidad a largo plazo, ni estudios de toxicidad genética o de toxicidad reproductiva en animales.

No se han realizado estudios durante la reproducción en un modelo animal.

CONTRAINDICACIONES

Accualaxan polvo para solución oral no debe ser utilizado en los siguientes casos:

- Pacientes que presenten hipersensibilidad al Macrogol 3350.
- Pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal.
- **Afecciones inflamatorias graves del intestino (como colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y megacolon tóxico).**
- **Perforación o riesgo de perforación intestinal.**
- **Dolor abdominal de causa indeterminada.**

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El Macrogol 3350 no ha demostrado tener interacciones con otros medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS

Puede presentarse: náuseas, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. Las dosis altas pueden producir diarrea y un mayor número de evacuaciones.

SOBREDOSIFICACION

No se han reportado casos de sobredosis. La producción de diarrea sería el evento esperado más importante. Ante una sobredosis de Macrogol 3350, se puede presentar deshidratación debida a la diarrea. Administrar líquidos suficientes.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL**