



TRAMADOL 100 mg 2 mL

ANALGÉSICO MODERADAMENTE NARCÓTICO

COMPOSICIÓN.

Cada Ampolla de 2 mL, contiene Tramadol (como Clorhidrato) 100mg.
Excipientes: EDTA disódico, Metil Parabeno, Hidróxido de Sodio / Acido Clorhídrico para ajustar pH c.s. Agua estéril para inyección c.s.p.

INDICACIONES.

Tratamiento del dolor moderado a severo, tanto agudo como crónico así como procedimientos diagnósticos o terapéuticos dolorosos.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad al medicamento, a sus excipientes o a los analgésicos de acción central. Embarazo y lactancia. Intoxicación aguda por alcohol, hipnótica, analgésicos opioides y psicofármacos. No se debe administrar a pacientes que reciben medicamentos IMAO o que hayan recibido estos medicamentos en las dos semanas previas. Paciente epilépticos deben ser cuidadosamente monitoreados. No se debe utilizar como medicamento sustitutivo en caso de síndrome de abstinencia a los opioides.

ADVERTENCIAS.

Tramadol debe emplearse con cuidado en pacientes dependientes de los opioides, pacientes con trauma craneoencefálico cuando hay shock, disminución del nivel de conciencia de origen no especificado. Trastornos del centro de la función respiratoria.

Tramadol tiene un bajo índice de dependencia, sin embargo con el uso prolongado se puede presentar dependencias psíquicas y físicas.

PRESENTACIÓN.

Caja x 10 Unidades, Ampollas, Solución Inyectable.

VIA ADMINISTRACION.

Subcutánea - Intramuscular - Intravenosa

Ver más información en Monografía del producto (se adjunta).-

REG. ISP F-14439/14