



PRODUCTO:	VERMOIL comp. 200 mg	FECHA	VERSIÓN	HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN:	00E	22/03/17	00E	
CODIGO EAN				
CODIGO PRODUCTO	14641			
DIMENSIONES:	105 x 147 mm.			
DOBLEZ:	35 x 147			
COLOR:	Negro			
SUSTRATO:	Bond 56 gr			
FECHA ARTE:		NOMBRE DEL ARCHIVO: 14641 VERMOIL.pdf		

FOLLETO DE
INFORMACION AL PACIENTE

VERMOIL
COMPRIMIDO 200 MG

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no esté seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

1. COMPOSICION

Cada comprimido contiene:
Albendazol 200mg
Excipiente c.s.

Excipientes: Almidón de maíz, polividona, talco, estearato de magnesio.

2. VIA DE ADMINISTRACION

Oral

3. CLASIFICACION

Antihelmintico

4. RECOMENDACIONES DE USO

Tratamiento de parasitosis intestinales de uno o varios parásitos: Abquilostomiasis, Enterobiasis, Ascaridiasis, Triccuriasis, Anguiluliasis, Estrongiloidosis, Hidatidosis, Capilaroasis, Clonorquiasis, Neurocisticercosis.

5. CONTRAINDICACIONES

Embarazo o sospecha de embarazo.
Hipersensibilidad conocida al albendazol o sus constituyentes.
Lactancia.
Epilepsia.
Niños menores de 1 año.

6. ADVERTENCIA Y
PRECAUCIONES

Lactancia: no administrar en este periodo, a menos que se considere que los beneficios potenciales superan a los riesgos potenciales asociados con el tratamiento.

Ancianos: No requiere ajuste de dosis en pacientes sanos. Administrar con precaución en pacientes con edad avanzada que tengan evidencia de Insuficiencia Hepática. Ud. debe comunicar a su médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes:

- Enfermedad Renal (riñones)
 - Enfermedad Hepática (hígado)
- Los alimentos ricos en grasa aumentan la biodisponibilidad del fármaco, por tanto cuando se necesite una concentración plasmática aumentada se debe administrar con comidas y por el contrario si lo que se quiere es una concentración plasmática disminuida, se administrará antes de las comidas.

7. INTERACCIONES

Albendazol en conjunto con Praziquantel; aumenta las concentraciones plasmáticas del metabolito activo del Albendazol.

8. EFECTOS ADVERSOS

Efectos gastrointestinales: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos.

Efectos centrales: cefalea, vértigo.

Efectos de hipersensibilidad: fiebre, rash cutáneo, prurito.

9. DOSIFICACION

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso no obstante la dosis media aconsejada para adultos y mayores de 2 años es de 2

comprimidos o 10 ml de suspensión una sola, aumentos en la dosis el médico lo debe indicar según la infestación. En menores de 1 a 2 años la dosis media recomendada es de 1 comprimidos o 5 ml de suspensión una sola, aumentos en las dosis el médico lo debe indicar según la infestación.

10. ALMACENAMIENTO

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No recomiende este medicamento a otra persona.

11. PRESENTACIONES

Envase con 1 frasco de 10 ml 40 mg/ml.

Envase con 2 y 6 tabletas de 200 mg.

Fabricado por:
ITF LABOMED
FARMACEUTICA LTDA.
Av. Pdte. Edo. Frei Montalva s/n
Panamericana Norte Km 21.5
Santiago Chile
Para:
DROGUERÍA FARMOQUIMICA
DEL PACIFICO
Distribuido por:
DROGUERÍA FARMOQUÍMICA
DEL PACIFICO
Sergio Valdovinos N° 1455
Qta. Normal - Santiago Chile