

## Elixine Lentocap. Teofilina 125 mg 20 Cápsulas



ELIXINE

Laboratorio: SAVAL

*Drogas:*

- Teofilina

*Acciones:*

- Aparato Respiratorio:Antiasmáticos

*Acciones:*

- Solución oral:cada 15 ml contiene: Teofilina 80 mg.**Lentocaps (cápsulas de acción prolongada) 125 mg:**cada lentocap contiene: Teofilina Anhidra 125 mg.**Lentocaps (cápsulas de acción prolongada) 250 mg:**cada lentocap contiene:



Teofilina Anhidra 250 mg.**Lentocaps (cápsulas de acción prolongada) 300 mg:**cada lentocap contiene: Teofilina Anhidra 300 mg.

- Antiasmático.
- Asma bronquial aguda y crónica; bronquitis obstructiva; broncoespasmo asociado a enfisema y bronquitis crónica.
- Según indicación médica. Dosis recomendadas:**Solución oral:***Adultos:* 3 cucharadas (45 ml) 3 veces al día, de preferencia antes de las comidas, durante 2 días. Después, 2 cucharadas (30 ml) 3 veces al día, de mantención. *Dosis máxima en ataques asmáticos:* 5 cucharadas en dosis única. *Niños:* 0.6 mg/kg 3 veces al día, durante 2 días; después, 0.4 mg/kg 3 veces al día, de mantención. *Dosis máxima en ataques asmáticos:* 1 mg/kg, en dosis única.**Lentocaps:**(la posología deberá regirse por esquema de dosificación basado en teofilinemia). La posología promedio es: *Adultos y niños mayores de 12 años:* 250 mg ó 300 mg cada 12 horas. *En casos severos:* 250 mg ó 300 mg cada 8 horas. *Niños de 6 a 12 años:* 60 mg ó 125 mg cada 12 horas, como dosis promedio. *En casos severos:* 1 cápsula de 60 mg ó 125 mg cada 8 horas.
- No administrar a personas sensibles a la droga, ni en hipertiroidismo.
- **Solución oral:**envase conteniendo 250 ml.**Lentocaps 125 mg:**envase conteniendo 20 lentocaps.**Lentocaps 250 mg:**envase conteniendo 20 lentocaps.**Lentocaps 300 mg:**envase conteniendo 20 lentocaps.