

FOLLETO MEDICO

FOLLETO PARA INFORMACION
MEDICA EXCLUSIVAMENTE
INCLUIDO EN EL ENVASE DE
VENTA AL PUBLICO

DERMABIOTICO (R), es una asociación de antibióticos destinados a la terapia local de las infecciones bacterianas dérmicas.

Contiene:

- I.- Polimixina B Sulfato, una denominación general que corresponde a un grupo de polipéptidos básicos, constituidos por aminoácidos de peso molecular 1.000, forman sales con los ácidos, muy solubles en agua, utilizándose en la práctica el Sulfato de Polimixina B, el menos tóxico de todos. Su estructura química no está dilucidada completamente.
- II.- Neomicina Sulfato, es un antibiótico aminoglicósido que se obtiene del Streptomyces Fradiae, microorganismo aislado del suelo.
- .. Generalmente estos antibióticos están disponibles para uso tópico ya que sus concentraciones séricas cuando se aplican en forma dérmica, prácticamente no son detectables.

Acción Antimicrobiana

Esta asociación de dos antibióticos no sistémicos permite ampliar el espectro antimicrobiano, principalmente centrando su acción sobre gram positivos y gram negativos tales como estreptococos, neumococos, gonococos, meningococos, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Estafilococos aureus, Enterobacter y la mayoría de las cepas de Proteus y Serratia.


Es importante señalar la susceptibilidad de la Pseudomona aeruginosa o bacilo piocianico a esta asociación; también hay sensibilidad frente a actinomicetes.

No actúan prácticamente sobre rickettsias y virus.

Usos Clínicos

- *Previene la entamación bacteriana sobre todo en quemaduras menores, abrasiones, alusiones, rozaduras, etc*
- Otitis externa.
- ~~Ecdyuvante en el tratamiento del acné vulgar.~~
- En general en las dermatosis bacterianas sensibles a los antibióticos señalados como: impétigo, foliculitis, piodermis, tratamiento complementario de furunculosis y antrax, lesiones secundarias de la piel.
- ~~Como prevención contra infecciones en cortes, abrasiones, rasguños y quemaduras menores; como ayuda a la cicatrización.~~

Instituto de Salud Pública
Departamento de Control Nacional
Sección Registro de Medicamentos y Productos Químicos



CONTRAINDICACIONES

No debe administrarse a individuos que presenten antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos.

Esta contraindicado en presencia de lesiones tuberculosas del ojo.

No usar en el canal auditivo externo cuando el tímpano esté perforado ni en persona que presenten hipersensibilidad a alguno de los principios activos

PRECAUCIONES

El uso indiscriminado de esta forma farmacéutica puede dar por resultado la proliferación de hongos u otros organismos no susceptibles. Puede presentarse hipersensibilidad cruzada con otros aminoglicósidos. Por el potencial de nefrotoxicidad y ototoxicidad de la kanamicina se debe tener mucha precaución al aplicarlo con

hasta 10 minutos en quemaduras extensas, ulceraciones tíficas y otras enfermedades donde sea posible la absorción de kanamicina

INTERACCIONES

No se han detectado interacciones con esta asociación, especialmente porque su uso está limitado a la forma tópica.

REACCIONES ADVERSAS

En casos aislados pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad caracterizadas por rash cutáneo, dermatitis y alergia que desaparecen al suspender su uso.

SINTOMAS Y TRATAMIENTO DE DOSIS EXCESIVA

No se han registrado casos con la aplicación excesiva de este compuesto, esto se ve reforzado por la propiedad que tienen estos antibióticos de no producir acción sistémica.

VIA DE ADMINISTRACION - POSOLOGIA

Uso Tópico - No usar en los ojos

Dosis Usual y Procedimiento

Aplíquese directamente sobre la zona afectada y cubra con una gasa estéril si es necesario. Puede aplicarse 2 a 5 veces al día según sea necesario.

PRESENTACION

Pomo de 15 gramos

Envases clínicos de 50 y 100 pomos.

