



SAVAL

Ciproval Ciprofloxacino 0,3% Solución Otológica 5 MI





CIPROVAL OTICO

Laboratorio: SAVAL

Drogas:

- Ciprofloxacino

Acciones:

- Antiinfecciosos de Uso Sistémico:Antibióticos:Quinolonas
- Otorrinolaringológicos:Productos de Uso Otico

Acciones:

- Cada 100 ml de solución ótica contiene: Ciprofloxacino 0.3 g.
- Antibacteriano ótico.
- Ciproval Otico está indicado en el tratamiento de infecciones óticas causadas por gérmenes sensibles a ciprofloxacino.
- Según prescripción médica. *Dosis usual: Adultos y niños mayores de 1 año:* administrar 3-7 gotas en el conducto auditivo externo 3 veces al día durante 7 a 14 días.
- No administrar a individuos con antecedentes previos de hipersensibilidad a ciprofloxacino u otra quinolona.
- Envase conteniendo 5 ml.

Ciproval Ciprofloxacino 0,3% Solución Otológica 5 mL

¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

Ciprofloxacino se utiliza para tratar infecciones provocadas por bacterias sensibles a este antibiótico tales como ciertas infecciones respiratorias, en la piel y tejidos blandos, infecciones del urinario y algunas infecciones de transmisión sexual como gonorrea, infecciones gastrointestinales como diarrea del viajero, infecciones en huesos y articulaciones.

¿Requiere indicación médica?

Sí, el uso de antibióticos requiere diagnóstico e indicación médica. La dosis también debe ser indicada por el médico, dependiendo de la edad del paciente y su condición médica.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

- Este medicamento está contraindicado en el embarazo; si está embarazada o sospecha estarlo, no utilice el medicamento e informe a su médico.
- Realice el tratamiento por el período indicado y no lo suspenda antes de tiempo aunque los síntomas hayan desaparecido. Si lo hace, la infección podría complicarse debido a la aparición de bacterias resistentes.



- Usualmente no se debe administrar ciprofloxacino a los menores de 18 años; salvo que presenten infecciones graves que no puedan ser tratadas con otros antibióticos. Si va a administrar ciprofloxacino a un menor de 18 años, asegúrese de que corresponda al prescrito por el médico.