





EUROGESIC

Laboratorio: SAVAL

Drogas:

- Naproxeno

Acciones:

- Aparato Locomotor: Antiinflamatorios no Esteroides
- Aparato Locomotor: Antirreumáticos Antiartríticos

Acciones:

- **Comprimidos adultos:** cada comprimido contiene: Naproxeno Sódico 275 mg. **Comprimidos pediátricos:** cada comprimido contiene: Naproxeno Sódico 100 mg. **Supositorios pediátricos:** cada supositorio contiene: Naproxeno Sódico 50 mg. **Suspensión oral:** cada 1 ml de suspensión reconstituida contiene: Naproxeno Sódico 25 mg.
- Analgésico. Antipirético. Antiinflamatorio no esterooidal.
- Como analgésico y antiinflamatorio en procesos inflamatorios y dolorosos, crónicos y agudos de tejidos blandos y músculo esquelético. Como analgésico y antiinflamatorio en bursitis, tendinitis, sinovitis, tensosinovitis, lumbago. Para acción analgésica después de torceduras, esguinces, manipulaciones ortopédicas, extracciones dentales y cirugía. Para relajación uterina y analgésico en el post-parto para la madre que no amamanta. Como analgésico en dismenorrea y luego de inserción de DIU. Como analgésico antiinflamatorio en artritis reumatoidea, osteoartritis (artritis degenerativa), espondilitis anquilosante y gota.
- **Adultos:** 2 comprimidos de 275 mg como dosis inicial y luego 1 comprimido cada 6 a 8 horas. 1-2 comprimidos de 550 mg cada 8 horas. **Niños: Mayores de 6 años:** 1 comprimido de 100 mg ó 4 ml de suspensión cada 8 horas. **Menores de 6 años:** 1 supositorio pediátrico ó 2 ml de suspensión cada 8 horas. *En artritis reumatoide juvenil:* 10 mg/kg/día cada 12 horas.
- Embarazadas, lactantes y en los casos de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico u otros AINEs (posibilidad de hipersensibilidad cruzada).
- **Comprimidos adultos:** envase conteniendo 10 comprimidos. **Comprimidos pediátricos:** envase conteniendo 10 comprimidos. **Supositorios pediátricos:** envase conteniendo 6 supositorios. **Suspensión oral:** envase conteniendo 60 ml.