

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Prospecto:

Lea todo el prospecto con atención antes de usar Microgynon CD.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Este prospecto le proporcionará información sobre los beneficios y riesgos de utilizar anticonceptivos orales. También le aconsejará sobre el empleo adecuado de Microgynon CD y sobre cuándo consultar a su médico en circunstancias relacionadas con la salud. Si tiene alguna duda, por favor consulte a su médico o profesional de la salud.
- Este medicamento se le ha prescrito para usted personalmente y no debe pasarlo a otras personas. Puede ser nocivo para ellas.

En este prospecto:

1. ¿Qué es Microgynon CD?
2. ¿Cuándo no debe usar Microgynon CD?
3. ¿Qué debe usted saber antes de usar Microgynon CD?
4. ¿Cuándo debe consultar a su médico?
5. ¿Cómo se usa Microgynon CD?
6. ¿Qué efectos secundarios puede aparecer al usar Microgynon CD?
7. Más sobre la píldora
8. Instrucciones de conservación.

Su píldora anticonceptiva se llama:

Microgynon CD grageas

Composición completa

Cada gragea de color café claro contiene: etinilestradiol (0.03 mg) y Levonorgestrel (0.15 mg) más excipientes.

Cada gragea de color blanco contiene: excipientes

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Los demás **excipientes** son lactosa, monohidrato, almidón de maíz, povidona 25.000, talco, estearato de magnesio, sacarosa, polividona 700.000, macrogol 6.000, carbonato de calcio, glicerol al 85%, dióxido de titanio, pigmento óxido de hierro amarillo, cera glicolmontana.

Propiedad de la autorización de comercialización:

La siguiente compañía es responsable de la comercialización de Microgynon CD:

<Anotar el nombre y la dirección de la compañía filial local **autorizada en Registro Sanitario**>

Fabricante:

Microgynon CD es producido por:

<Anotar el nombre y la dirección de la compañía fabricante **autorizada en Registro Sanitario**>

¿Qué es Microgynon CD?

Tipo de píldora:

Microgynon CD es un anticonceptivo oral combinado (“la píldora combinada”) que consta de 21 grageas de **color café** claro con principios activos y 7 grageas inactivas, de color blanco. Cada una de las grageas activas contiene una pequeña cantidad de dos hormonas femeninas diferentes. Estas son Levonorgestrel (un progestágeno) y etinilestradiol (un estrógeno). Debido a las cantidades pequeñas de hormonas, Microgynon CD se considera un anticonceptivo oral de baja dosis. Como todas las grageas del envase combinan las mismas hormonas a la misma dosis, se considera un anticonceptivo oral combinado monofásico.

¿Por qué usar Microgynon CD?:

Microgynon CD se emplea para impedir el embarazo.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Los anticonceptivos orales son un método muy eficaz de control de la natalidad. Cuando se toman correctamente (no olvidar ninguna gragea), la posibilidad de quedar embarazada es muy baja.

Envases y grageas:

Microgynon CD se presenta en un envase blíster que contiene 28 grageas.

Las grageas de Microgynon CD se presentan en envases blíster formados por láminas transparentes de cloruro de polivinilo y láminas metálicas de aluminio (cara mate termosellable).

¿Cuándo no debe usar Microgynon CD?

No use la píldora combinada si presenta usted alguna de las situaciones mencionadas a continuación. Si presenta usted alguna de ellas, consulte a su médico antes de comenzar a usar Microgynon CD. Su médico puede aconsejarle el uso de un tipo de píldora diferente o un método de control de la natalidad totalmente diferente (no hormonal).

- Si usted tiene o ha tenido alguna vez una enfermedad que afecte la circulación sanguínea. En especial, aquellas relacionadas con la trombosis (formación de un coagulo de sangre) en los vasos sanguíneos de las piernas (trombosis venosa profunda), en los pulmones (embolismo pulmonar), en el corazón (ataque cardiaco) o en otras partes del cuerpo (ver también la sección que aparece más adelante en este prospecto llamada “La píldora y la trombosis”).
- Si tiene o ha tenido un accidente cerebrovascular (causado por un coágulo de sangre o una rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro).
- Si tiene o ha tenido alguna vez situaciones que puedan ser el primer signo de ataque cardiaco (como una angina de pecho o un dolor en el pecho) o de un accidente cerebrovascular (como un ataque isquémico transitorio, o un accidente cerebrovascular reversible leve).

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

- Si tiene antecedentes de migraña acompañada, por ejemplo, de síntomas visuales, dificultad para hablar o debilidad o adormecimiento de cualquier parte del cuerpo.
- Si tiene diabetes Mellitus con lesión de los vasos sanguíneos.
- Si tiene o ha tenido una pancreatitis (una inflamación del páncreas) asociada a niveles altos de sustancias grasas en la sangre.
- Si tiene ictericia (piel amarillenta) o enfermedad hepática grave o *Trastornos en el metabolismo de las grasas y lípidos*.
- Si tiene o ha tenido un cáncer que pueda crecer por la influencia de hormonas sexuales (por ej. de las mamas o de los órganos genitales).
- Si tiene o ha tenido un tumor del hígado, benigno o maligno.
- Si tiene cualquier hemorragia vaginal sin explicación.
- *Hipertensión arterial severa o no controlada*
- Si está embarazada o piensa que podría estarlo.
- Si es hipersensible (alérgica) a etinilestradiol, a levonorgestrel o a cualquier otro componente de Microgynon CD.

Si aparece por primera vez cualquiera de estas situaciones mientras se usa la píldora, deje de tomarla inmediatamente y consulte a su médico. Entretanto, emplee medidas anticonceptivas no hormonales. Ver también “Observaciones generales” en el apartado siguiente.

¿Qué debe usted saber antes de usar Microgynon CD?:

Observaciones generales:

En este prospecto se describen varias situaciones en las que se debe dejar de tomar la píldora, o que pueden disminuir su seguridad. En tales situaciones, no se deben tener relaciones sexuales o se deben tomar precauciones anticonceptivas no hormonales adicionales, por ej.: usar un condón u otro

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

método de barrera. No utilice los métodos del ritmo o de la temperatura. Estos métodos pueden no ser seguros, ya que la píldora altera los cambios normales de temperatura y moco cervical que tienen lugar durante el ciclo menstrual.

Microgynon CD como todas las píldoras anticonceptivas, no protege contra la infección por VIH (SIDA) ni contra ninguna otra enfermedad de transmisión sexual.

Antes de comenzar a usar Microgynon CD:

Si la píldora combinada se usa en presencia de cualquiera de las situaciones enumeradas a continuación, usted debe ser mantenida en estrecha observación. Su médico puede explicarle esto. Por lo tanto, si presenta cualquiera de estas situaciones, comuníquese a su médico antes de comenzar a usar Microgynon CD:

- Usted fuma.
- Tiene diabetes.
- Tiene exceso de peso.
- Tiene la presión sanguínea alta.
- Tiene alteración valvular cardíaca o determinada alteración del ritmo cardíaco.
- Tiene una inflamación en las venas (flebitis superficial).
- Tiene venas varicosas.
- Cualquier familiar directo ha tenido una trombosis, un ataque cardíaco o cerebrovascular.
- Padece jaquecas.
- Padece epilepsia.
- Usted o algún familiar directo tiene o ha tenido niveles sanguíneos altos de colesterol o triglicéridos (sustancias grasas).
- Algún familiar directo ha tenido alguna vez cáncer de mama.
- Tiene una enfermedad hepática o de la vesícula biliar.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

- Tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (enfermedad inflamatoria crónica del intestino).
- Tiene lupus eritematosos sistémico (LES, una enfermedad que afecta la piel en todo el cuerpo).
- Tiene síndrome hemolítico-urémico (SHU, una alteración de la coagulación sanguínea que causa insuficiencia renal).
- Tiene anemia de células falciformes.
- *Enfermedad ocular de origen vascular*
- Tiene algún problema de salud que se presentó por primera vez o empeoró durante el embarazo o el uso previo de hormonas sexuales (por ej.: pérdida de audición, una enfermedad metabólica denominada porfiria, una enfermedad de la piel llamada herpes gestacional o una enfermedad neurológica llamada corea de Sydenham).
- Tiene o ha tenido cloasma (parches de pigmentación pardo-amarillenta en la piel especialmente en la cara). Si es así, evite la exposición excesiva al sol o a la radiación ultravioleta.

Si alguna de las condiciones anteriores se presenta por primera vez, reaparece o empeora mientras está usando la píldora, consulte a su médico.

La píldora y la trombosis:

Trombosis es la formación de un coágulo de sangre que puede ocluir un vaso.

La trombosis se presenta a veces en las venas profundas de las piernas (trombosis venosa profunda). Si este coágulo se desprende de la vena donde se ha formado, puede alcanzar y ocluir las arterias de los pulmones, causando el llamado “embolismo pulmonar”. La trombosis venosa profunda es algo poco frecuente. El riesgo de presentar tromboembolismo venoso es más alto durante el primer año en el cual la mujer emplea la píldora.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

El tromboembolismo venoso puede aparecer tanto si se toma como si no se toma la píldora. También puede presentarse si usted queda embarazada. El riesgo es más alto en las usuarias de la píldora que en las no usuarias, pero no tan alto como durante el embarazo.

Los coágulos sanguíneos también pueden producirse, aunque muy raramente, en los vasos sanguíneos del corazón (causando un ataque cardíaco) o del cerebro (causando un accidente cerebrovascular). En casos extremadamente raros, se pueden tomar coágulos sanguíneos en hígado, intestino, riñón u ojo.

Muy ocasionalmente, la trombosis puede causar complicaciones permanentes graves o puede, incluso, ser fatal.

El riesgo de padecer un ataque cardíaco o cerebrovascular aumenta con la edad. También aumenta cuando más se fume. **Cuando use la píldora debe dejar de fumar, especialmente si tiene más de 35 años de edad.**

Si desarrolla presión sanguínea alta tomando la píldora, es posible que le digan que deje de tomarla.

El riesgo de padecer trombosis venosa profunda se incrementa temporalmente como resultado de una operación o inmovilización (por ej.: cuando tiene una o las dos piernas enyesadas o con una férula). En las mujeres que usan la píldora el riesgo puede ser todavía más alto. En caso de que la vayan a hospitalizar o a operar, comuníquelo a su médico con suficiente antelación que toma la píldora. Su médico puede aconsejarle dejar de tomarla varias semanas antes de la operación o en el momento de la inmovilización. Su médico también le dirá cuándo puede empezar a tomarla de nuevo después de la recuperación.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Si observa signos posibles de una trombosis, deje de tomar la píldora y consulte a su médico inmediatamente (ver además “¿Cuándo debe consultar a su médico?”).

La píldora y el cáncer:

El cáncer de mama se ha diagnosticado algo más frecuentemente en mujeres que toman la píldora que en mujeres de la misma edad que no la toman. Este ligero incremento en el número de diagnósticos de cáncer de mama desaparece gradualmente durante el transcurso de los 10 años siguientes a la interrupción de la píldora. No se sabe si la diferencia es causada por la píldora. Puede deberse a que las mujeres fueron examinadas con más frecuencia, de tal manera que el cáncer de mama se detectó antes.

En casos raros, se han reportado tumores hepáticos benignos e, incluso más raramente, tumores hepáticos malignos en usuarias de la píldora. Estos tumores pueden conducir a hemorragias internas. Consulte con su médico inmediatamente si tiene dolor abdominal intenso.

El factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer cervical lo constituye la infección persistente por el virus del papiloma humano. Algunos estudios han señalado que el empleo a largo plazo de la píldora puede contribuir adicionalmente a este aumento del riesgo, pero sigue debatiéndose hasta qué punto este hallazgo es atribuible a otros factores, por ej.: realización periódica de citologías y conducta sexual, incluyendo el uso de anticonceptivos de barrera.

La píldora y el embarazo:

Las mujeres que están embarazadas, o que piensan que pudieran estarlo, no deben usar Microgynon CD. Si sospecha que está embarazada mientras emplea Microgynon CD, debe consultar a su médico cuanto antes.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

La píldora y la lactancia:

No se recomienda el uso de Microgynon CD durante la lactancia. Si desea tomar la píldora durante la lactancia, por favor consulte a su médico.

La píldora y la capacidad de conducir:

No se ha observado ningún efecto.

La píldora y otros medicamentos:

Algunos medicamentos pueden afectar negativamente la acción de la píldora. Entre ellos están los medicamentos que se emplean para el tratamiento de la epilepsia (por ej.: primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato); de la tuberculosis (por ej.: rifampicina, rifabutina) y de la infección por el VIH (por ej.: ritonavir), antibióticos (por ej.: penicilinas, tetraciclinas, griseofulvina) para el tratamiento de otras enfermedades infecciosas y el producto de herbolario denominado hierba de San Juan (que se emplea principalmente para el tratamiento de trastornos depresivos). La píldora también puede interferir con la acción de otros medicamentos.

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos o productos de herbolario, incluso los adquiridos sin receta. Igualmente, comunique a cualquier otro médico u odontólogo que le prescriba otro medicamento (o al farmacéutico que se lo dispensa) que usted usa Microgynon CD. Ellos pueden decirle si es necesario que tome precauciones anticonceptivas adicionales y, de ser así, durante cuánto tiempo.

¿Cuándo debe consultar a su médico?:

Reconocimientos médicos regulares

Cuando use la píldora, su médico le dirá que acuda de nuevo a la consulta para los reconocimientos médicos regulares

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Consulte a su médico en cuando pueda, si:

- Observa cualquier cambio en su salud especialmente que afecte a cualquiera de los puntos mencionados en este prospecto (ver también: “Cuándo no debe usar Microgynon CD” y “Antes de comenzar a usar Microgynon CD”, no olvide los puntos relacionados con sus familiares directos).
- Nota un nódulo en la mama.
- Va a usar otros medicamentos (ver también “La píldora y otros medicamentos”).
- Va a estar inmovilizada o la van a operar (consulte a su médico al menos con cuatro semanas de antelación).
- Tiene hemorragias vaginales inusuales e intensas.
- Tiene una diarrea intensa.
- No tuvo el período dos veces seguidas o sospecha que está embarazada (no empiece el envase siguiente hasta que no se lo diga su médico).

Deje de tomar las grageas y consulte a su médico inmediatamente si observa posibles signos de trombosis, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular como:

- Tos desacostumbrada
- Dolor intenso en el pecho que puede alcanzar el brazo izquierdo
- Falta de aliento
- Cualquier dolor de cabeza o jaqueca desacostumbrada, grave o prolongada.
- Pérdida parcial o completa de la visión, o visión doble
- Dificultad o imposibilidad para hablar
- Cambios repentinos en la audición, sentido del olfato o del gusto
- Mareos o desvanecimientos
- Debilidad o adormecimiento en cualquier parte del cuerpo
- Dolor intenso en el abdomen
- Dolor intenso o hinchazón en cualquiera de las dos piernas

Las situaciones o síntomas antes mencionados se explican en más detalle en otra parte de este prospecto

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

¿Cómo se usa Microgynon CD?:

“El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es”:

¿Cuándo y cómo se toman las grageas?

Tome su gragea aproximadamente a la misma hora todos los días, si es necesario con algo de líquido. Cada envase de Microgynon contiene 21 grageas activas y 7 placebos (grageas carentes de principio activo). Las 28 grageas están colocadas de forma que pueden tomarse durante 28 días consecutivos, sin interrupción alguna. En general, la regla mensual se presenta durante los días en que se están tomando las grageas de la zona roja. En los envases se señala el día de la semana en que debe tomarse cada gragea.

El comienzo del primer envase de Microgynon CD:

Cuando no se ha usado ningún anticonceptivo hormonal el mes anterior.

Empiece a tomar Microgynon CD el primer día del ciclo, es decir, el primer día de la hemorragia menstrual. La primera gragea se extrae de una de las casillas dentro de la zona roja del envase, marcadas con el día de la semana que corresponde (por ej.: “Lun” para lunes). Siguiendo el sentido de las flechas impresas se toma una gragea diaria hasta acabar el envase. En el envase-calendario se señala el día de la semana en que debe tomarse cada gragea, con lo que resulta muy fácil comprobar si se tomó o no la gragea diaria.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Al día siguiente de haber tomado la última gragea de un envase de Microgynon CD se continúa el tratamiento, sin interrupción, extrayendo la primera gragea del envase siguiente de la casilla marcada con el día de la semana correspondiente, dentro de la zona roja. Durante los primeros 14 días del primer ciclo de tratamiento deben emplearse adicionalmente medicas anticonceptivas, no hormonales **como el uso de condón o espermicida (exceptúe** los métodos del ritmo según Ogino-Knaus y de la temperatura), si se quiere obtener plena protección contra el embarazo desde el primer día del tratamiento.

En caso de que usted hubiera estado tomando hasta ahora otro anticonceptivo hormonal, o hubiera tenido un parto o aborto recientemente, consulte a su médico sobre la fecha más apropiada para iniciar el tratamiento.

Si toma demasiadas grageas de Microgynon CD (sobredosis):

No se han observado efectos nocivos graves por tomar demasiadas grageas de Microgynon CD a la vez (grageas de color **café claro**). Si usted ha tomado varias grageas de una vez, pueden aparecer náuseas, vómitos o hemorragias vaginales. Si descubre que un niño ha tomado Microgynon CD, consulte a su médico. **Si esto no es posible, concurra al hospital más cercado con la caja de medicamento.** La toma de grageas de color blanco es inofensiva, porque no contienen principios activos.

Cuando usted quiera dejar de tomar Microgynon CD:

Usted puede dejar de tomar Microgynon CD en cualquier momento que quiera. Si deja de tomar Microgynon CD porque quiere quedar embarazada, se recomienda generalmente esperar hasta haber tenido una regla normal antes de intentar concebir. Esto le ayudará a calcular cuándo será el parto.

Si no quiere quedar embarazada, consulte a su médico sobre métodos de control de la natalidad.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Qué hacer si...

...olvida tomar grageas

Si olvidó tomar grageas de color blanco, sigue estando protegida frente a un embarazo porque no contienen ningún principio activo. No obstante, para garantizar que no se cambia el ritmo de toma de grageas, que es importante para la seguridad anticonceptiva de la píldora, debe seguir con la siguiente gragea en su día normal y desechar las grageas inactivas (grageas de color blanco) olvidadas para evitar cualquier confusión.

Los siguientes consejos se refieren a las grageas activas olvidadas (grageas de color amarillo):

- Si han transcurrido **menos de 12 horas** desde la hora habitual en que toma su gragea, entonces se mantiene la seguridad de la píldora. Tome la gragea en cuanto usted se de cuenta del olvido y tome las grageas siguientes a las horas habituales
- Si han transcurrido **más de 12 horas** desde la hora habitual en que toma su gragea activa, puede haberse reducido la seguridad de la píldora y es necesario utilizar protección anticonceptiva de barrera adicional a la píldora. Cuántas más grageas activas consecutivas haya olvidado, tanto más alto es el riesgo de que el efecto anticonceptivo disminuya.

1 gragea olvidada durante la semana 1:

Tome la gragea olvidada en cuanto se de cuenta del olvido (incluso si esto significara tomar dos grageas a la vez) y tome las grageas siguientes a la hora habitual. Tome precauciones anticonceptivas adicionales (método de barrera) durante los próximos 7 días.

Si ha tenido relaciones sexuales en la semana anterior al olvido de la gragea, existe la posibilidad de quedar embarazada. Comuníquese inmediatamente a su médico.

1 gragea olvidada durante la semana 2:

Tome la gragea olvidada en cuanto se de cuenta del olvido (incluso si esto significa tomar dos grageas a la vez) y tome las grageas siguientes a la hora

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

habitual. Se mantiene la seguridad de la píldora. No necesita tomar precauciones anticonceptivas adicionales.

1 gragea olvidada durante la semana 3:

Usted puede elegir cualquiera de las dos opciones siguientes, sin tomar precauciones anticonceptivas adicionales siempre y cuando durante los 7 días anteriores a la primera gragea olvidada haya tomado todas las grageas correctamente. Si no es así, adopte la primera opción que se indica a continuación y tome medidas anticonceptivas adicionales durante los siguientes 7 días:

1. Tome la gragea olvidada en cuanto se de cuenta del olvido (incluso si esto significa tomar dos grageas a la vez) y tome las grageas siguientes a la hora habitual. Descarte las grageas blancas. Empiece el próximo envase inmediatamente de tal manera que no haya interrupción alguna entre envases. Es posible que usted no tenga una hemorragia por privación hasta terminar las grageas del segundo envase, pero podría presentar un manchado o una hemorragia por disrupción en los días que toma grageas.

O

2. Deje de tomar las grageas de su envase actual, haga una pausa sin toma de grageas de 7 días o menos (cuente también el día en que olvidó tomar la gragea) y continúe con el próximo envase. Si sigue este método, puede comenzar siempre el envase siguiente el mismo día de la semana como en otras ocasiones.

Si ha tenido relaciones sexuales en la semana anterior al olvido de la gragea, existe la posibilidad de quedar embarazada. Comuníquelo inmediatamente a su médico.

Más de una gragea olvidada en un envase

Consulte a su médico

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Qué hacer si ...

... sufre trastornos gastrointestinales (por ej.: vómitos, diarrea intensa)

Si vomita o sufre una diarrea intensa, pueden no haberse absorbido completamente los principios activos de la gragea de Microgynon CD. Si vomita en las 3 a 4 horas siguientes a la toma de la gragea, es como si no la hubiera tomado. Por tanto, siga las instrucciones para las grageas olvidadas. Si sufre una diarrea intensa, consulte a su médico.

... tiene hemorragias inesperadas

Con todas las píldoras, durante los primeros meses, pueden aparecer hemorragias vaginales irregulares (manchados o hemorragia por disrupción) entre regla y regla. Puede que usted tenga que usar compresas, pero continúe tomando sus grageas como siempre. La hemorragia vaginal irregular normalmente cesa una vez que su cuerpo se haya acostumbrado a la píldora (normalmente después de unos 3 ciclos de toma de grageas). Consulte a su médico si continúa, es más intensa o empieza de nuevo.

... no ha tenido una regla

Si ha tomado todas las grageas en su momento y no ha vomitado ni sufrido una diarrea intensa ni ha utilizado otros medicamentos, entonces es un poco probable que esté usted embarazada. Continúe tomando Microgynon CD como siempre.

Si no ha tenido la regla dos veces seguidas, usted puede estar embarazada. Consulte a su médico inmediatamente. No empiece el envase siguiente de Microgynon CD hasta que su médico haya comprobado que usted no está embarazada.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

¿Qué efectos secundarios pueden aparecer al usar Microgynon CD?:

Como todos los medicamentos, Microgynon CD puede tener efectos secundarios.

Informe a su médico si observa cualquier efecto no deseado, especialmente si es grave o persistente, o si hay un cambio en su estado de salud que piensa que pudiera ser causado por la píldora.

Efectos secundarios graves:

Las reacciones graves asociadas al uso de la píldora, así como los síntomas relacionados, se describen en las secciones “La píldora y la trombosis/La píldora y el cáncer”. Por favor, lea estas secciones de información adicional y consulte a su médico de inmediato en caso necesario.

Otros posibles efectos secundarios:

Los siguientes efectos secundarios han sido comunicados por usuarias de la píldora, aunque no tienen por qué haber sido causados por la píldora. Estos efectos secundarios pueden presentarse en los primeros meses en los que usa la píldora y normalmente disminuyen con el tiempo.

Órgano o sistema	Frecuente (≥1/100)	Poco frecuente (>1/1.000 <1/100)	Raro (<1/1.000)
Trastornos oculares			Intolerancia a los lentes de contacto
Trastornos gastrointestinales	Náuseas, dolor abdominal	Vómito, diarrea	
Trastornos inmunitarios			Hipersensibilidad
Investigaciones	Aumento de peso		Disminución de peso
Trastornos del metabolismo y de la nutrición		Retención de líquidos	

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MICROGYNON CD GRAGEAS

Órgano o sistema	Frecuente ($\geq 1/100$)	Poco frecuente ($>1/1.000 < 1/100$)	Raro ($< 1/1.000$)
Trastornos del sistema nervioso	Dolor de cabeza	Migraña	
Trastornos psiquiátricos	Estado de ánimo depresivo, cambios del estado de ánimo	Disminución de la libido	Aumento de la libido
Trastornos mamarios y del sistema reproductor	Hipersensibilidad y dolor en las mamas	Hipertrofia de las mamas	Flujo vaginal, secreción por las mamas
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo		Exantema, urticaria	Eritema nodoso, eritema multiforme

Si observa usted algún efecto secundario no mencionado en este inserto, por favor infórmelo a su médico.

Más sobre la píldora:

La píldora combinada también puede tener beneficios para la salud no relacionados con la anticoncepción.

Su regla puede ser poco abundante y durar menos. Como consecuencia, el riesgo de anemia puede ser más bajo. Los dolores menstruales pueden ser menos intensos o pueden desaparecer completamente,

Instrucciones de conservación:

Almacenar a no más de 30°C

Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños

No utilizar después de la fecha de caducidad impresa el envase

Incompatibilidades:

Ninguna

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
MICROGYNON CD GRAGEAS

Fecha de la última revisión del prospecto:

CMAB: 15.03.05

CECLA: 15.06.05

***NO REPITA EL USO DE ESTE MEDICAMENTO SIN INDICACIÓN
MÉDICA***

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO