




INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A.

CARDICON RETARD DOBLE

FOLLETO INFORMACION MEDICA



CARDICON RETARD 10 y 20 mg.

Flexibilidad en la terapia antihipertensiva.

CARDICON RETARD 10.

OTRA alternativa para el manejo inicial de la hipertensión arterial.

- Baja dosis
- Un comprimido cada 12 horas.
- Pacientes que responden con dosis menores.


CARDICON RETARD.

Tratamiento de la hipertensión arterial establecida, de moderada a severa.

CARDICON RETARD.


- Niveles plasmáticos eficaces y sin oscilaciones.
- Comoda posología
- Optima tolerancia

*Grafico de niveles plasmáticos y respuesta tensional:
Adaptado de Cld, E. y Cds. Evaluación de la biodisponibilidad de
preparados convencionales y de acción prolongada de Nifedipino.
U. de Chile 1986. Estudio doble ciego con 6 pacientes hipertensos.*





INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A.



Fórmula:

Cada comprimido de acción sostenida de Cardicon Retard contiene 20 mg de Nifedipino. Cada comprimido de acción sostenida de Cardicon Retard 10 contiene 10 mg de Nifedipino.

Indicaciones:

- Hipertensión arterial moderada a severa, como monoterapia o asociado a otros antihipertensivos.
- Angina pectoris crónica en todas sus formas: Angina estable; Angina progresiva; Angina de Prinzmetal y Angina Post-infarto (8 días después del infarto).

Contraindicaciones:

Embarazo, hipotensión severa y shock cardiovascular.

Efectos secundarios:

Pueden observarse al inicio del tratamiento cefaleas, rubefacción y sensación de calor. Al utilizar dosis elevadas, raras veces se presentan vértigos, reacciones cutáneas, hipotensión, palpitaciones y taquicardia.

Precauciones:

Debe cuidarse la administración a pacientes dializados, con falla renal con hipovolemia ya que puede presentarse un descenso brusco en la presión.

Dosificación: En general se recomienda un comprimido cada 12 hrs.

Departamento
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas