

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

ICAPS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

ICaps ~~17~~ comprimidos, fórmula con **vitaminas, minerales**, luteína y Zeaxantina.

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

1-COMPOSICION Y PRESENTACION:

Cada comprimido contiene:

Vitamina A * (como Beta caroteno)	3300 U.I. (2 mg)
Ácido ascórbico (Vitamina C)	200 mg
Vitamina E	75 mg U.I. (75 mg)
Riboflavina (Vitamina B-2)	5 m
Zinc (como acetato de zinc dihidratado)	30 mg
Selenio	20 mcg
Cobre	2 mg
Manganeso	5 mg
Luteína / Zeaxantina	2 mg

* Incorporada como 3300 UI de Beta caroteno

Ingredientes: ~~Acido ascórbico, acetato de zinc dihidratado, hidroxipropil metilcelulosa, hipromelosa, gelatina, celulosa microcristalina, acetato de dl-alfa-tocoferilo, fosfato dicálcico, fosfato dibásico de calcio, dióxido de silicio, estearato de magnesio, quelato de aminoácido y manganeso, sacarosa, quelato de aminoácido y cobre, almidón de maíz, quelato de aminoácido y selenio, dióxido de titanio, riboflavina, polietilén glicol, beta caroteno, luteína / zeaxantina, palmitato de ascorbilo, dl-alfa-tocoferol, ascorbato de sodio, Acido sórbico, polisorbato 80, benzoato de sodio, cera carnauba, macrogol, triacetina.~~

2-CLASIFICACION:

Polivitaminico con minerales

3-INDICACION:

~~Aporte de vitaminas y minerales~~

Suplemento de vitaminas y minerales en estados carenciales.

4-CONTRAINDICACIONES:

No usar este producto en pacientes que presenten: antecedentes de alergia a cualquier componente de la formulación, hipervitaminosis, daño renal, insuficiencia hepática, úlcera gastroduodenal, litiasis cálcica.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL
Nº Ref.: 2106/01
SECCIÓN REGISTRO

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
Departamento Control Nacional

REGISTRO Nº F-15.739/06

02 OCT 2006

5-ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Usted y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

- a) Alergias: Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado, una reacción alérgica a este medicamento, o alguna otra sustancia, ya sea alimento, preservantes, colorantes u otros saborizantes.
- b) Embarazo: Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo.
- c) Lactancia: Ud. debe conversar con el médico acerca de la conveniencia del uso de este producto mientras está amamantando.

6-INTERACCIONES:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su contenido junto con otros (interacciones). Ud. Debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, **especialmente si se trata de medicamentos que contienen: levodopa, isoniácida, hidralazina, cicloserina, anticonceptivos, penicilina, colestiramina, colestipol, aceite mineral (vaselina para uso oral), neomicina.**

7-EFECTOS ADVERSOS:

~~Hasta la fecha, no se ha reportado ningún efecto adverso asociado al uso de ICaps LZ, comprimidos, fórmula con Luteína y Zeaxantina.~~ Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados de los que se pretenden obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. **Puede presentarse reacciones de hipersensibilidad (alergias al medicamento), también podría producirse** ~~malestar epigástrico dolor gástrico y náuseas,~~ **por tanto si se toman no se debe consumir el producto los comprimidos** con el estómago vacío y es por esta razón que se recomienda tomarlos junto a las comidas, a fin de evitar problemas estomacales. **También se ha descrito náuseas, diarreas, estreñimiento.** Si usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su médico.

8-FORMA DE ADMINISTRACION Y DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: un comprimido por día con LAS COMIDAS, o como lo indique su médico. No romper los comprimidos antes de consumirlos. No use más o con mayor frecuencia que la que su médico indique.

9-CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños.

Mantener en su envase original.

Almacenar en un lugar seco a temperatura ambiente, **a no más de 25° C**

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE