MAVER

Mulcatel Sucralfato 10% Suspensión 200 mL



MULCATEL

Laboratorio: MAVER

Drogas:

Sucralfato

Acciones:

• Aparato Digestivo:Antiulcerosos

Acciones:

• Cada 100 ml de suspensión contiene: Sucralfato 10 g.

- Antiulceroso.
- Ulcera gástrica y duodenal, esofagitis de reflujo en adultos y niños.
- Adultos: para el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal y para la esofagitis de reflujo, 1 cucharada de las de postre (10 ml) 4 veces al día, 1 ó 2 horas antes de las comidas y al acostarse. El tratamiento no debe suspenderse antes de 4 a 8 semanas; si es necesario pueden administrarse en forma simultánea antiácidos para el alivio del dolor, pero distanciado en no menos de ½ hora de la administración de sucralfato. Niños menores de 6 años: tratamiento de esofagitis de reflujo: 1 cucharadita (5 ml) 4 veces al día, ½ hora antes de las comidas y al acostarse. Niños mayores de 6 años: 1 cucharada de postre (10 ml) 4 veces al día, ½ hora antes de las comidas y al acostarse. El tratamiento debe proseguirse durante no menos de 4 semanas.
- Envase conteniendo 200 ml.