

FICHA TECNICA

SALOFALK SUPOSITARIOS 500 mg

Mesalazina

Composición: Supositorios 500 mg: cada supositorio contiene: Mesalazina 500 mg.

Acción Terapéutica: Antiinflamatorio intestinal.

Vía de administración: Rectal.

Indicaciones: Tratamiento de la colitis ulcerosa activa de leve a moderada limitada al recto (proctitis ulcerosa).

Posología: En adultos y ancianos se sugiere 1 supositorio de Salofalk una o dos veces al día insertado en el recto, durante 2 o 3 semanas. El tratamiento con Salofalk 500 mg supositorios debe utilizarse de manera regular y constantemente para lograr efectos terapéuticos deseados. La duración de uso se determina por el médico. Hay poca experiencia y sólo documentación limitada sobre los efectos en niños.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la mesalazina o a los salicilatos. En pacientes con úlcera péptica activa. En pacientes con problemas de coagulación. En pacientes con daño severo de la función renal y hepática. No debe administrarse a niños menores de 6 años, mujeres embarazadas o en períodos de lactancia, por no disponerse de estudios suficientes.

Precauciones: Deberán efectuarse análisis de sangre y de orina antes y durante el tratamiento.

Condiciones de almacenamiento: Almacenado a no más de 25°C. Protegido de la luz.

Presentaciones: Estuche conteniendo 30 supositorios.