

FICHA TECNICA

Nombre Comercial : BLADURIL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200 mg

Principio Activo : FLAVOXATO CLORHIDRATO

Registro I.S.P. N° : F-15612/16

Período de Eficacia : 24 meses

Presentación : x 20 comprimidos recubiertos

Fabricante : Farmacéutica Paraguaya S.A.

Conservación : Almacenado a no mas de 30° C

Clasificación Farmacológica : Antiespasmódico vesical

Indicaciones:

Tratamiento de la disuria, nocturia, dolor suprapúbico, frecuencia, o incontinencia que pueden aparecer en casos de cistitis, prostatitis, uretritis, uretrocistitis, uretrotrigonitis.

Como coadyuvante en el tratamiento antiespástico de cálculos renales y ureterales, y disturbios espásticos urinarios producidos por cateterismo y citoscopia. Secuelas de intervenciones quirúrgicas sobre las vías urinarias bajas.

En el tratamiento sintomático de los estados espásticos de las vías genitales femeninas como dolor pélvico, dismenorrea, hipotonía y disquinesia urinaria

Contraindicaciones:

Condiciones obstructivas (pilórica o duodenal de intestino o íleo). Acalasia. Hemorragia gastrointestinal. Uropatías obstructivas del tracto urinario bajo, lesiones obstructivas intestinales o ilíacas.

Precauciones y Advertencias:

No se recomienda su uso durante el embarazo ni en menores de 12 años, por no haberse establecido su seguridad en dichos casos.

En los pacientes con infección concomitante de las vías genitourinarias, debe asociarse un tratamiento antiinfeccioso adecuado.

Se utilizará con precaución en pacientes con glaucoma, especialmente en la forma de ángulo cerrado, y pacientes en tratamiento que deban conducir vehículos, manejar maquinaria peligrosa o realizar trabajos de precisión, por la posibilidad de aparición de efectos secundarios como somnolencia, visión borrosa y vértigo.

Se recomienda no consumir alcohol durante el tratamiento, ya que puede aumentar la somnolencia producida por el Flavoxato

Reacciones Adversas:

Han sido observados los siguientes efectos adversos, Pero no son datos suficientes para sustentar una estimación de su frecuencia.

Gastrointestinal: Nauseas, vómitos (que en general desaparecen si se ingiere el fármaco después de las comidas), sequedad de boca.

Dedicados a tu Salud

Sistema nervioso central: Vértigo, dolor de cabeza, confusión mental (especialmente en ancianos), somnolencia (que en general disminuye si se reduce la dosis administrada o se amplía el intervalo entre las administraciones), nerviosismo.

Hematológicas: Leucopenia (un caso la cual fue reversible discontinuando la droga).

Cardiovascular: Taquicardia y palpitaciones.

Alérgicas: Urticarias y otras dermatosis, eosinofilia e hiperpirexia.

Oftálmicas: Incremento de la presión ocular, visión borrosa, disturbios en la acomodación ocular.

Posología y Forma de Administración:

En general se recomiendan 200 mg 3 a 4 veces por día. Puede asociarse a terapia antiinfecciosa.



 Q.F. ILSE PONCE G.
DIRECTOR TÉCNICO
RUT: 12.264.838-9

Q.F. ILSE PONCE GALLARDO
Director Técnico

/mvm