

VIII PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO (Estuche Venta)

LERTUS

Diclofenaco Sódico 75 mg/3 ml Solución Inyectable ampollas

Cada ampolla de Camboontiene: de 3 mL con solución inyectable contiene:

Diclofenaco sódico Excipientes c.s.

75,0 mg

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

No dejar al alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica.

Advertencia: No administrar por más de una semana sin indicación médica.

Vía de administración: Intramuscular cintravenosa

Almacenar a no más de 30°C

Registro I.S.P.:

Serie

Vence

INSTITUTO I I DE FUELLOA
DEPART
REGISTRO E F-103/19/01

NA
ALC

VEN. DICA
TIPO A

DEPARTMENTO 000 TO DE MACIONAL

NO. 101 25 45 1/2

10/09/09

Elaborado en Paraguay por NIDAD LA SERVICIONES FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

Distribuido por LABORATORIO VOLTA S.A.

J. M. Carrera 14-A Colina - Santiago

para

TECNOFARMA S.A.

Las Violetas 2169, Providencia Santiago - Chile



VIII PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO (Estuche M. Médica)

LERTUS

Diclofenaco Sódico 75 mg/3 ml Solución Inyectable ampollas

Cada ampolla de 3 ml contienes solución inyectable contiene:

Diclofenaco sódico Excipientes c.s.

75,0 mg 3.0 ml

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

No dejar al alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica.

Advertencia: No administrar por más de una semana sin indicación médica.

Vía de administración: Intramuscular intravenosa

Almacenar a no más de 30°C

Muestra médica prohibida su venta.

Registro I.S.P.:

Serie


Vence





Elaborado en Paraguay por FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. Distribuido por LABORATORIO VOLTA S.A. J. M. Carrera 14-A Colina - Santiago para TECNOFARMA S.A.

Las Violetas 2169, Providencia Santiago - Chile



VIII PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO (Estuche E. Clínico)

LERTUS

Diclofenaco Sódico 75 mg/3 ml Solución Inyectable *****ampollas

Cada ampolla de 3 ml contienes solución inyectable contiene:

Diclofenaco sódico Excipientes c.s.

75,0 mg 3:0 ml

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

No dejar al alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica.

Advertencia: No administrar por más de una semana sin indicación médica.

Vía de administración: Intramuscular cointravenosa


Almacenar a no más de 30°C


Envase clínico solo para establecimientos asistenciales.

Registro I.S.P.:

Serie

Vence





25451/02 DEPART UNIDAD DE MODIFICACIONES

> Elaborado en Paraguay por FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. Distribuido por LABORATORIO VOLTA S.A. J. M. Carrera 14-A Colina - Santiago para TECNOFARMA S.A. Las Violetas 2169, Providencia

Santiago - Chile