

VIII PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO (Estuche Venta)

LERTUS

Diclofenaco Sódico 75 mg/3 ml Solución Inyectable ampollas

Cada ampolla de Cantinoniemo: de 3 mL con solución inyectable contiene:

Diclofenaco sódico Excipientes c.s.

75,0 mg

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

No dejar al alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica.

Advertencia: No administrar por más de una semana sin indicación médica.

Vía de administración: Intramuscular cintravenosa

Almacenar a no más de 30°C

Registro I.S.P.:

Serie

Vence

INSTITUTO I I DE FUELLO A
DEPART
REGISTRO E F-103/19/01

WA
ALC

VEN. DICA
TIPO A

DEPARTMENTO 000 TO LIMETON II NO. 125 25 45 1/2 10/09/03

Distribuido por

LABORATORIO VOLTA S.A.

J. M. Carrera 14-A

Colina - Santiago

para

TECNOFARMA S.A.

Las Violetas 2169, Providencia Santiago - Chile

LERTUS

Diclofenaco Sódico 75 mg/3 ml
Solución inyectable



VIII PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO (Estuche M. Médica)

LERTUS

Diclofenaco Sódico 75 mg/3 ml Solución Inyectable ampollas

Cada ampolla de 3 ml contienes solución inyectable contiene:

Diclofenaco sódico Excipientes c.s.

75,0 mg 3.0 ml

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

No dejar al alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica.

Advertencia: No administrar por más de una semana sin indicación médica.

Vía de administración: Intramuscular cintravenosa


Almacenar a no más de 30°C

Muestra médica prohibida su venta.

Registro I.S.P.:

Serie


Vence





Elaborado en Paraguay por FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. Distribuido por LABORATORIO VOLTA S.A. J. M. Carrera 14-A Colina - Santiago para TECNOFARMA S.A. Las Violetas 2169, Providencia

Santiago - Chile



VIII PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO (Estuche E. Clínico)

LERTUS

Diclofenaco Sódico 75 mg/3 ml Solución Inyectable **M**ampollas

Cada ampolla de 3 ml contienes solución inyectable contiene:

Diclofenaco sódico Excipientes c.s.

75,0 mg 3,0 mb

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

No dejar al alcance de los niños.

Dosis e indicaciones según prescripción médica.

Advertencia: No administrar por más de una semana sin indicación médica.

Vía de administración: Intramuscular aintravenosa

Almacenar a no más de 30°C

Envase clínico solo para establecimientos asistenciales.

Registro I.S.P.:

Serie

Vence

INSTITUTO DE ENLUD PUBLICA F-10319/01 MANIEN ALCANGE

> PARAE ... LECIMIENTOS MEDICO - ASISTENCIALES



Elaborado en Paraguay por FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. Distribuido por LABORATORIO VOLTA S.A. J. M. Carrera 14-A Colina - Santiago para TECNOFARMA S.A. Las Violetas 2169, Providencia

Santiago - Chile