

FICHA TECNICA

Nombre Comercial : FLUXUS COMPRIMIDOS 10 mg
Principio Activo : Flunarizina Diclorhidrato
Registro I.S.P. N° : F-5591/15
Período de Eficacia : 36 meses
Presentación : Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos
Fabricante : Farmacéutica Paraguaya S.A.
Conservación : Almacenar a no mas de 30° C
Clasificación Farmacológica : Vasodilatador cerebral y periférico.

Indicaciones:

Trastornos de la circulación cerebral:

Pérdida de concentración. Trastornos del sueño (despertar precoz). Alteraciones de la memoria.

Aislamiento social. Trastornos de la conducta. Fatiga psíquica. Incontinencia de esfínteres.

Depresiones involutivas. Cefalea vascular. Secuela de traumatismo encefalocraneano. Secuelas postopopléticas.

Trastornos vestibulares

Mareos. Vértigos. Náuseas, vómitos. Acúfenos. Mareos de viaje. Tinnitus. Nistagmo.

Trastornos de la circulación periférica

Claudicación intermitente. Ulceras tróficas y varicosas. Pregangrena. Parestesias. Calambres nocturnos. Extremidades frías.

Contraindicaciones:

No se conoce contraindicaciones para la flunarizina. A pesar de no existir evidencia de efectos embriotóxicos o teratogénicos en animales al prescribir flunarizina durante el embarazo se deben tener en cuenta los riesgos potenciales, frente a los posibles beneficios terapéuticos.

Se recomienda no administrarlo durante los 3 primeros meses de embarazo.

Hemorragia cerebral reciente.

Interacciones:

No presenta

Reacciones Adversas:

Con muy escasa frecuencia pudo observarse somnolencia o fatiga pasajera. Estos si se presentan, desaparecen reduciendo la posología a la mitad.

Vía de Administración y Dosificación:

Vía de administración: Oral

Posología: Salvo criterio médico, se recomienda 1 a 2 comprimidos al acostarse.



Q.F. ILSE PONCE G.
DIRECTOR TÉCNICO
RUT: 12.264.838-9

Q.F. ILSE PONCE GALLARDO
Director Técnico

/mvm