

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-5591/20
Nombre	: FLUXUS COMPRIMIDOS 10 mg
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	:
Titular	: TECNOFARMA S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 6949
Fecha Inscribase	: 24/07/1986
Ultima Renovación	: 24/07/2020
Fecha Próxima renovación	: 24/07/2025
Régimen	: Importado Terminado
Vía Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Trastornos de circulación cerebral, trastornos vestibulares, trastornos de la circulación periférica.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Blister PVC cristal UV-Aluminio	36 meses	Almacenado a no más de 30°C	1-60	COMPRIMIDOS
Muestra Médica	Blister PVC cristal UV-Aluminio	36 meses	Almacenado a no más de 30°C	1-30	COMPRIMIDOS
Venta Público	Blister PVC cristal UV-Aluminio	36 meses	Almacenado a no más de 30°C	1-00	COMPRIMIDOS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA DE LABORATORIO VOLTA S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	DROGUERÍA NOVOFARMA SERVICE S.A.	CHILE
FABRICACIÓN EXTRANJERO TERMINADO	FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.	PARAGUAY
PROCEDENTE	FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.	PARAGUAY
DISTRIBUIDOR	MEGALABS CHILE S.A.	CHILE
IMPORTADOR	TECNOFARMA S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
FLUNARIZINA DICLORHIDRATO	11,800	mg	



Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000 Ñuñoa, Santiago Casilla 48 Correo 21 Código Postal 7780050	Mesa Central (56-2) 5755 101 Informaciones (56-2) 5755 201	Contacto con OIRS <u>Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias</u>
---	---	--

FICHA TECNICA

Nombre Comercial : FLUXUS COMPRIMIDOS 10 mg
Principio Activo : Flunarizina Diclorhidrato
Registro I.S.P. N° : F-5591/15
Período de Eficacia : 36 meses
Presentación : Envases conteniendo 30 y 60 comprimidos
Fabricante : Farmacéutica Paraguaya S.A.
Conservación : Almacenar a no mas de 30° C
Clasificación Farmacológica : Vasodilatador cerebral y periférico.

Indicaciones:

Trastornos de la circulación cerebral:

Pérdida de concentración. Trastornos del sueño (despertar precoz). Alteraciones de la memoria.

Aislamiento social. Trastornos de la conducta. Fatiga psíquica. Incontinencia de esfínteres.

Depresiones involutivas. Cefalea vascular. Secuela de traumatismo encefalocraneano. Secuelas postopopléticas.

Trastornos vestibulares

Mareos. Vértigos. Náuseas, vómitos. Acúfenos. Mareos de viaje. Tinnitus. Nistagmo.

Trastornos de la circulación periférica

Claudicación intermitente. Ulceras tróficas y varicosas. Pregangrena. Parestesias. Calambres nocturnos. Extremidades frías.

Contraindicaciones:

No se conoce contraindicaciones para la flunarizina. A pesar de no existir evidencia de efectos embriotóxicos o teratogénicos en animales al prescribir flunarizina durante el embarazo se deben tener en cuenta los riesgos potenciales, frente a los posibles beneficios terapéuticos.

Se recomienda no administrarlo durante los 3 primeros meses de embarazo.

Hemorragia cerebral reciente.

Interacciones:

No presenta

Reacciones Adversas:

Con muy escasa frecuencia pudo observarse somnolencia o fatiga pasajera. Estos si se presentan, desaparecen reduciendo la posología a la mitad.

Vía de Administración y Dosificación:

Vía de administración: Oral

Posología: Salvo criterio médico, se recomienda 1 a 2 comprimidos al acostarse.



Q.F. ILSE PONCE G.
DIRECTOR TÉCNICO
RUT: 12.264.838-9

Q.F. ILSE PONCE GALLARDO
Director Técnico

/mvm