

FICHA TECNICA

Nombre Comercial : **MAGNATIL C CALCICO COMPRIMIDOS EFERVESCENTES**
Principio Activo : Acido ascórbico, Hipofosfito de calcio, Oxido de magnesio, Sulfato de magnesio heptahidratado
Registro I.S.P. N° : F-19011/16
Período de Eficacia : 36 meses
Presentación : Envases conteniendo 30 comprimidos efervescentes
Fabricante : Instituto Bioquímico Beta S.A.
Conservación : Almacenar a no más de 30° C
Clasificación Farmacológica : Suplemento de vitaminas y minerales

Indicaciones:

Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia asociada con hipovitaminosis C.
Aporte de Calcio.

Contraindicaciones:

Insuficiencia renal grave
Insuficiencia hepática grave
Hipercalcemia
Antecedentes de cálculos renales a repetición
Úlcera gástrica
Insuficiencia gástrica

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación

Efectos Secundarios: Ocasionalmente trastornos gástricos leves y diarreas.

Precauciones y Advertencias: No tomar más de tres comprimidos al día, ni tomar la dosis máxima por un período de más de 2 semanas, salvo por indicación médica expresa.

Puede tener efecto laxante

Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente.

Si está embarazada o amamantando, debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

Precauciones:

No administrar más de tres comprimidos al día, ni administrar la dosis máxima por un período de más de 2 semanas.

Puede tener efecto laxante.

Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente

Interacciones:

Evitar la administración conjunta con tetraciclinas, porque disminuye la absorción del antibiótico.

La administración conjunta con sales cálcicas o productos a base de fosfatos inhiben la absorción intestinal del magnesio.

Vía de Administración y Dosificación:

Disolver el comprimido efervescente en medio vaso de agua o bebida refrescante.


Q.F. ILSE PONCE GALLARDO
Director Técnico

/mvm