## **ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FICHA TECNICA**



Nombre Genèrico: ESOMEPRAZOL

Nombre Comercial: ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETAS ENTERICAS

Concentración: 40 MG

Titular (es) del Registro Sanitario: WINTHROP PHARMACEUTICALS DE COLOMBIA S.A.

Fabricante(s): SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.

FAREVA VILLA RICA S.A.S.

DATOS DEL PRINCIPIO ACTIVO

Nombre Quimico Especifico: 5-Methoxy-2-{(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-

pyridyl)methyl]sulfinyl}benzimidazole Magnesium Trihydrate

Formula Molecular: C34H36MgN6O6S2,3H2O

Peso Molecular: 767.2 g/mol

No de CAS: 217087-09-7

Indicaciones:

Contraindicaciones:

DATOS DEL PRODUCTO TERMINADO

REFLUJO GASTROESOFÁGICO (ESOFAGITIS POR REFLUJO EROSIVO, TRATAMIENTO PREVENTIVO A LARGO PLAZO DE RECAÍDAS DE

ESOFAGITIS CICATRIZADA, TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DEL REFLUJO

GASTROESOFÁGICO), EN ÚLCERA PÉPTICA Y DUODENAL Y EN

COMBINACIÓN PARA ERRADICAR EL HELICOBACTER PYLORI

(CICATRIZACIÓN DE LA ÚLCERA DUODENAL OCASIONADA POR EL HELICOBACTER PYLORI, PREVENCIÓN DE LAS RECAÍDAS DE ÚLCERAS

PÉPTICAS EN LOS PACIENTES CON ÚLCERAS RELACIONADAS CON

HELICOBACTER PYLORI).

SI SURGE ALGÚN SÍNTOMA ALARMANTE (POR EJEMPLO, PÉRDIDA DE

PESO CONSIDERABLE E INVOLUNTARIA, VÓMITO RECURRENTE,

DISFAGIA, HEMATEMESIS O MELENA) Y SI SE CONFIRMA O SE SOSPECHA DE UNA ÚLCERA GÁSTRICA, DEBE DESCARTARSE LA PRESENCIA DE UNA

ENFERMEDAD MALIGNA YA QUE EL TRATAMIENTO CON ESOMEPRAZOL PUEDE ALIVIAR LOS SÍNTOMAS Y RETRASAR SU DIAGNÓSTICO. DEBE

TENERSE PRECAUCIÓN EN MUJERES EMBARAZADAS Y NO DEBE UTILIZARSE DURANTE LA LACTANCIA. LOS PACIENTES TRATADOS CON

ESOMEPRAZOL DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE TIEMPO TIENEN

EL RIESGO DE GENERAR NIVELES BAJOS DE MAGNESIO SÉRICO

(HIPOMAGNESEMIA) LA CUAL PUEDE MANIFESTAR $\stackrel{.}{ ext{Y}}$ E CON ALTERACIONES

DE LA FRECUENCIA CARDIACA (PALPITACIONES RÁPIDAS) U OTROS

SÍNTOMAS COMO ESPASMOS MUSCULARES TEMBLORES O CONVULSIONES; EN LOS NIÑOS, LAS TASAS ANORMALES DEL CORAZÓN

PUEDEN CAUSAR FATIGA, MALESTAR ESTOMACAL, MAREOS Y

ATURDIMIENTO. LA HIPOMAGNESEMIA SE PUEDE PRESENTAR CON INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES Y/O ASOCIADOS A DIGOXINA,

DIURETICOS DE ASA Y TIAZIDICOS, SOLOS O COMBINADOS CON OTRO ANTIHIPERTENSIVOS. EVÍTESE EL CONSUMO CONCOMITANTE CON

MEDICAMENTOS COMO FUROSEMIDA, ÁCIDO ETACRÍNICO,

CLOROTIAZIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, INDAPAMIDA Y METOLAZONA.

## 1 de 2

## **ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FICHA TECNICA**



EL ESOMEPRAZOL PUEDE REDUCIR LA ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA DEL CLOPIDOGREL, DEBIÉNDOSE AJUSTAR LAS DOSIS. RIESGO DE DIARREA

POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE. PREGÚNTELE A SU MÉDICO O

FARMACÉUTICO SOBRE EL USO DE ESTE MEDICAMENTO SI USTED ESTÁ

TOMANDO WARFARINA, CLOPIDOGREL O CILOSTAZOL

Contraindicaciones: (ANTICOAGULANTES), O SI USTED ESTA TOMANDO ANTIRRETROVIRALES

RECETADOS (MEDICAMENTOS PARA LA INFECCIÓN POR EL VIH) ESTE MEDICAMENTO CONTIENE LACTOSA. LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE INTOLERANCIA A LA GALACTOSA, DEFICIENCIA DE LACTASA LAPP O MAL-ABSORCIÓN DE GLUCOSA- GALACTOSA NO DEBERÍAN TOMAR ESTE

PRODUCTO.

Condiciones de Almacenamiento: MANTENGASE EN LUGAR SECO A TEMPERATURAS INFERIORES A 30°C

Registro Sanitario: INVIMA 2021M-0005553-R2

Modalidad del Registro Sanitario: FABRICAR Y VENDER

Vigencia del Registro Sanitario: 10/12/2026

Còdigo ATC: A02BC05

Presentación Comercial: Caja plegadiza por 450 tabletas entéricas en blíster PVC/PVDC/ALU por 15

tabletas cada uno.

Còdigo CUM: 19960390-14

Vida Util: 2 AÑOS

Condición de Venta: CON FORMULA FACULTATIVA

Còdigo de Barras: 7705959885618

Elaborado por: Balmiro A. Canedo Barraza

Fecha: 29.09.2022