



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



FÓRMULA INFANTIL

Fórmula infantil con hierro y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga para lactantes prematuros y con bajo peso al nacer

(Denominación en el Registro Sanitario)



COMPOSICIÓN

FÓRMULA CUALITATIVA

INGREDIENTES: leche descremada, sólidos de jarabe de maíz, triglicéridos de cadena media (aceite MCT), lactosa, concentrado de proteína de suero, aceite de soja, aceite de coco, **MINERALES:** (hidróxido de potasio, fosfato de calcio, citrato de potasio, carbonato de calcio, cloruro de magnesio, Citrato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, selenato de sodio), **VITAMINAS:** (ácido ascórbico, m-inositol, bitartrato de colina, cloruro de colina, niacinamida, acetato de d-alfa tocoferilo, pantotenato de calcio, palmitato de vitamina A, Riboflavina, clorhidrato de cloruro de tiamina, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, betacaroteno, biotina, filoquinona, vitamina D3, cianocobalamina), lecitina de soja, monoglicéridos, aceite de M. alpina **, carragenina, aceite de C. Cohnii *, taurina, l-carnitina, Citidina 5-Monofosfato, Disanos Guanosina 5-Monofosfato, Disodio Uridina 5-Monofosfato y Adenosina 5-Monofosfato.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100 mL: Energía 81 Cal, 340 kJ, Proteína 2.4 g, Grasas 4.41 g, Ácido Linoleico 568 mg, Ácido Linoléico 79 mg, Ácido Araquidónico (AA) 0.014 g, Ácido docosahexaenoico (DHA) 0.009 g, Carbohidratos 8.4 g, **VITAMINAS:** Vitamina A 1015 IU, Vitamina D 122 IU, Vitamina E 3.2 IU Vitamina K 10 mcg, Tiamina (Vitamina B1) 203 mcg, Riboflavina (Vitamina B2) 503 mcg, Vitamina B6 203 mcg, Vitamina B12 0.45 mcg, Niacina 4060 mcg, Ácido fólico 30 mcg, Ácido pantoténico 1543 mcg, Biotina 30 mcg, Vitamina C 30 mg, Colina 8 mg, Inositol 32 mg, **MINERALES:** Calcio 146 mg, Fósforo 81 mg, Magnesio 9.74 mg, Hierro 1.5 mg, Zinc 1.2 mg, Manganeso 9.7 mcg, Cobre 203 mcg, Yoduro 5 mcg, Sodio 35 mg, Potasio 105 mg, Cloruro 66 mg, Selenio 1.5 mcg, Nucleótidos 7.2 mg.

INFORMACIÓN REGULATORIA

REGISTRO SANITARIO	RSA-0009835-2020
NÚMERO DE EXPEDIENTE	20178579
CATEGORÍA DEL REGISTRO	Fórmula Infantil
VIGENCIA	21/04/2025
TITULAR	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S
FABRICANTE	Abbott Laboratories Columbus Ohio
IMPORTADOR	Abbott Laboratories de Colombia S.A.S
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	• 12 meses
MATERIAL DE ENVASE	• Botella: EPM/ Estabilizante/ Adhesivo/EVAL tapa: disco metálico en acero inoxidable y poliéster.
PRESENTACIONES COMERCIALES	• Botella de 2 Oz

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

SIMILAC® SPECIAL CARE	EAN 13	EAN 14
SIMILAC SPC 24 kcal 2oz x 48 fcos	7703186029027	17703186029024

PRECAUCIONES

- Consumir antes de la fecha de expiración indicada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

- Uso oral

INFORMACIÓN DE CALIDAD

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conserve la lata cerrada a temperatura ambiente. Una vez abierta la lata, el contenido debe consumirse dentro de las tres semanas siguientes. Cubra la lata y guárdela en un lugar fresco y seco (no refrigerar) y a una temperatura no mayor a 30°C.

DATOS DE CONTACTO

En caso de tener alguna queja relacionada con la calidad del producto, o un evento adverso por favor comunicarse al Teléfono: 628 56 00 - Ext.: 5785, Call Center: 01800 5189379 ó escribir al correo electrónico: pss.anicolumbia@abbott.com

DECLARACIÓN DE CALIDAD

El producto se fabrica en un sitio de manufactura soportado por un sólido sistema de aseguramiento de calidad en cumplimiento con todos los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades sanitarias del país de origen y de las regulaciones locales aplicables. El sitio de manufactura cuenta con certificaciones de calidad e inocuidad que cumplen los más altos estándares internacionales. El producto se encuentra incluido dentro del programa de vigilancia post mercadeo de la compañía.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

La leche materna es el mejor alimento para el niño y debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida para lograr todos los beneficios nutricionales e inmunológicos del lactante menor. Una buena alimentación de la madre es importante para la preparación y mantenimiento de la lactancia materna. Introducir alimentación parcial o total con biberón incide negativamente en la calidad y cantidad de la lactancia materna y revertir la decisión de no amamantar es difícil. Las implicaciones sociales y financieras de la alimentación con fórmula deben tenerse en cuenta cuando se decide utilizar este método de alimentación. Cualquier uso inapropiado o innecesario de las fórmulas infantiles puede conllevar a riesgo en la salud. Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene el alimento puede ser perjudicial para la salud del niño. Un profesional de la salud debe ser consultado antes de iniciar la alimentación con una fórmula infantil.