

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO CONDONES PROFAMILIA

Condones de latex luoncados  Profamilia  Profamilia			
Registro Sanitario	IN\	VIMA 2022DM-0025043	
Clasificación Dispositivo	Clase IIb		
Usos		PROFAMILIA es altamente e medades de transmisión se	
Descripción del producto	caucho natural, de o reservorio. Cada condón PROFA empacado higiénico internacionales defini	AMILIA son preservativos ancho nominal 52 mm, lubra AMILIA es controlado electro amente para cumplir con la idos en la norma ISO 4074 § is de biocompatibilidad de	ónicamente y os estándares 4-14 y fueron
Especificaciones			
	Prueba	Especificación	Norma Tecnica
	Largo	min. 180 mm	ISO 4074:2015
	Ancho		UNFPA
	7	Min. 52 mm	ISO 4074:2015 UNFPA
	Grosor de pared	Min. 52 mm	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA
			ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015
	Grosor de pared	0.060 – 0.090 mm	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento	0.060 – 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga <25 mm a partir del extremo abierto	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento  Volumen de	0.060 – 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga < 25 mm a partir del extremo abierto del condón	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA ISO 4074:2015
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento  Volumen de estallamiento	0.060 – 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón  min. 1,0 kPa  min. 18 litros	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento  Volumen de estallamiento  Hongos y levaduras	0.060 – 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón  min. 1,0 kPa  min. 18 litros  Max. 10 UFC/g	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA UNFPA USP 40 NF 35
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento  Volumen de estallamiento	0.060 – 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón  min. 1,0 kPa  min. 18 litros	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento  Volumen de estallamiento  Hongos y levaduras Aerobios mesofilos	0.060 – 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga <25 mm a partir del extremo abierto del condón  min. 1,0 kPa  min. 18 litros  Max. 10 UFC/g  Max. 10 UFC/g	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA USP 40 NF 35 USP 40 NF 35
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento  Volumen de estallamiento  Hongos y levaduras Aerobios mesofilos S. aureus E. Coli Pseudomonas	0.060 - 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón  min. 1,0 kPa  min. 18 litros  Max. 10 UFC/g  Max. 10 UFC/g  Ausente	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA USP 40 NF 35 USP 40 NF 35 USP 40 NF 35
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento  Volumen de estallamiento  Hongos y levaduras Aerobios mesofilos S. aureus E. Coli	0.060 - 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón  min. 1,0 kPa  min. 18 litros  Max. 10 UFC/g  Max. 10 UFC/g  Ausente  Ausente  Ausente  Entre 400 y 700 mg	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA USP 40 NF 35 USP 40 NF 35 USP 40 NF 35 USP 40 NF 35
	Grosor de pared  Color  Detección de agujeros  Presión de estallamiento  Volumen de estallamiento  Hongos y levaduras  Aerobios mesofilos  S. aureus  E. Coli  Pseudomonas  Cantidad de Lubricante (polidimetilsiloxano	0.060 – 0.090 mm  Transparente  Ausencia de orificios o señales visibles de fuga ≤25 mm a partir del extremo abierto del condón  min. 1,0 kPa  min. 18 litros  Max. 10 UFC/g  Max. 10 UFC/g  Ausente  Ausente  Ausente	ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA ISO 4074:2015 UNFPA UNFPA USP 40 NF 35 USP 40 NF 35 USP 40 NF 35 USP 40 NF 35 USP 40 NF 35



	<u> Prorumit</u>		
Instrucciones de	IMPORTANTE: Lea detenidamente estas instrucciones antes de		
USO	usar Condones PROFAMILIA		
	1. Verifique la fecha de vencimiento impresa en el foil y use		
	el condón PROFAMILIA únicamente si se encuentra		
	vigente.		
	2. Al momento de uso verifique la integridad del foil en el		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	cual se encuentra empacado el Condón PROFAMILIA.		
	Absténgase de usar si el empaque se encuentra averiado,		
	si el foil se encuentra arrugado o si la burbuja de aire no es		
	palpable.		
	3. El foil debe abrirse con la yema de los dedos. No utilice		
	elementos cortopunzantes (tijeras, bisturí, llaves, joyas,		
	etc.) ni los dientes, ya que puede rasgar el látex del		
	condón.		
	4. Saque del empaque con cuidado el condón		
	PROFAMILIA y verifique que este esté listo para		
	desenrollar. Absténgase de usar si el condón se percibe		
	seco o quebradizo.		
	5. Coloque el condón PROFAMILIA sobre la cabeza del		
	pene erecto tomándolo por el reservorio (punta).		
	Desenrolle el condón PROFAMILIA a lo largo del pene		
	hasta llegar a la base del mismo. Verifique que no queden		
	burbujas de aire entre el condón y el pene.		
	6. El condón PROFAMILIA está listo para su uso en coito		
	vaginal.		
	7. Después de la eyaculación, retire el pene erecto de la		
	vagina sosteniendo el condón PROFAMILIA por el borde		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	para evitar derrame de semen.		
	8. Retire el condón PROFAMILIA del pene y deseche en		
	papelera para basura. No utilice el inodoro para tal fin.		
Precauciones de	- Producto de uso único: Use un condón PROFAMILIA nuevo		
Uso	por cada contacto sexual. No lo use dos veces. Reutilizar		
	un condón puede aumentar el riesgo de falla o infección.		
	- Los condones PROFAMILIA están diseñados únicamente		
	para uso en coito vaginal.		
	- Si la persona que esté usando el preservativo nota que		
	este se desprende o que le presiona de forma excesiva,		
	debe entonces interrumpir de inmediato la penetración		
	por riesgo de rotura del preservativo.		
	- El uso de dos o más condones PROFAMILIA		
	simultáneamente no aumenta la seguridad de uso del		
	condón y puede provocar fricciones que dañan el látex.		
	- En caso de usar lubricantes íntimos, se debe garantizar		
	que sea compatible con el látex del condón PROFAMILIA		
	- Las sustancias de aplicación tópica diferentes a		
	lubricantes íntimos (medicamentos, lociones, cremas,		
	jabones, vaselina, aceite de bebe, loción corporal,		
	aceites para masajes, mantequilla, margarina, etc.)		
	puede afectar la integridad del condón PROFAMILIA, por		
	lo cual se desaconseja su uso concomitante.		
	- En caso de sospechar o detectar una falla, acuda a una		
	IPS on las 72 horas postariores a la relación sexual. Allí se la		

IPS en las 72 horas posteriores a la relación sexual. Allí se le



	brindara atención médica a usted y su pareja.		
	- En caso de estar recibiendo algún tipo de tratamiento de		
	aplicación directa en el pene o en la vagina, ya sea con		
	o sin receta médica, se recomienda consultar con su		
	médico o farmacéutico.		
	- El látex NR puede causar una reacción alérgica		
	incluyendo choque anafiláctico.		
Presentaciones	Caja por 3 condones		
Comerciales	Caja dispensadora por 100 condones con inserto		
	Caja dispensadora de 500 condones con inserto		
Condiciones de	Almacénese en un lugar seco y fresco, entre 5°C y 30°C.		
almacenamiento	Manténgase fuera del alcance de los niños.		
	Producto no reutilizable. En caso de ruptura del empaque, no		
	use el producto.		
Fabricado por:	TNR Limited, Tailandia.		
Importado y	Asociación PPROFAMILIA		
distribuido por:	Calle 34 No 14 -52 Bogotá – Colombia		

Q.F. OSCAR FERNANDO TUTA CAIPA

Coordinador de Investigación y Desarrollo/Director Técnico Oscar.tuta@profamilia.org.co