

YODOPOVIDONA BUCOFARINGEO

Código Producto:	070427
Datos Farmacéuticos	
Registro Sanitario	Titular Registro Sanitario
INVIMA 2019M-005580-R4	Tecnofar TQ S.A.S Conjunto Industrial Parque Sur Km 24 Vía Cali – Santander
Compuesto Activo	Fabricante
Yodo Polivinilpirrolidona equivalente a Yodo Activo	Tecnofar TQ S.A.S Conjunto Industrial Parque Sur Km 24 Vía Cali – Santander
Forma Farmacéutica	Modalidad del Registro Sanitario
Soluciones	Fabricar y Vender

Especificaciones de Calidad según Métodos Generales USP y Método Interno SOL-350

ENSAYO	ESPECIFICACIÓN
DESCRIPCION	Líquido fluido, color marrón oscuro
VOLUMEN DE ENTREGA	Mínimo 120 mL/FCO
pH 25°C (USP VIGENTE)	1.5 - 6.5
GRAVEDAD ESPECIFICA 25°C	0.96 - 1.05
VISCOSIDAD	5.0 cps - 25.0 cps
ENSAYO YODO (USP VIGENTE)	0.68 g/100 mL - 0.96 g/100 mL
ENSAYO YODO (USP VIGENTE)	85.0% - 120.0%
Control microbiológico total:	
RECuento TOTAL DE MICROORGANISMOS AEROBIOS	Máximo 10 ² ufc/mL
RECuento TOTAL COMBINADO DE HONGOS FILAMENTOSOS Y LEVADURAS	Máximo 10 ¹ ufc/mL
MICROORGANISMOS ESPECIFICOS (AUSENCIA DE Staphylococcus aureus)	Ausentes
MICROORGANISMOS ESPECIFICOS (AUSENCIA DE Pseudomona aeruginosa)	Ausentes

Información General

Material de Envase y Empaque	Presentación Comercial
Frasco PEAD color blanco	Frascos por: 120 mL
Instrucciones de Uso	Vía de administración
1. Gargarismo: disolver dos cucharadas de Yodopovidona MK Bucofaríngeo en un vaso con agua; hacer gárgaras durante 2 minutos y botar. 2. Enjuague bucal: Disolver una cucharadita de Yodopovidona MK Bucofaríngeo en medio vaso con agua; hacer gárgaras durante 30 segundos y botar.	Bucal

Datos Clínicos

Indicaciones	Contraindicaciones y Advertencias
Antiséptico bucofaríngeo	Hipersensibilidad al yodo
Condiciones de Almacenamiento	
Almacenar a temperatura inferior a 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta sin fórmula médica.	