SmithNephew

Ficha Técnica

BACTIGRAS

Apósito de gasa parafinada impregnada con Clorhexidina al 0.5%



Modo de acción

Bactigras™ proporciona una capa protectora para la herida, en donde se deposita parafina a través de una malla de fibras de algodón, que gracias a su tejido tipo Leno (fibras dobles y trenzadas), permite el libre paso de exudado hacia un apósito absorbente. Además, contiene Acetato de Clorhexidina al 0.5% que actúa como agente antimicrobiano efectivo contra bacterias gram negativo, gram positivo, SARM, etc.

Indicaciones

Bactigras™ está indicado para heridas que no tengan más del 10% del área del cuerpo en donde haya un riesgo de infección o en heridas ya infectadas en conjunto con terapia sistémica de antibióticos. Debe ser utilizado para abrasiones y escaldaduras menores, sitios donadores y de injertos, heridas con pérdida de piel así como para heridas crónicas de úlceras de pie y úlceras por presión.

Contraindicaciones

- Bactigras™ no debe utilizarse en más del 10% del área del cuerpo.
- Raramente ocurre dermatitis, sensibilidad por contacto fotosensibilidad.
- Se ha reportado anafilaxia en casos raros.
- Evite el contacto con los ojos, el oído medio, meninges y cerebro.
- Bactigras™ es incompatible con jabones, materiales aniónicos y yoduro de potasio.
- Debe ser evitado el uso de Bactigras $^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$ con agentes limpiadores oxidantes.

Características

- Es una gasa parafinada con tejido de algodón impregnada con Clorhexidina al 0.5%.
- Malla de fibras de algodón dobles y trenzadas.
- Cubierta impregnada de parafina más acetato de Clorhexidina al 0.5% con amplio efecto antiséptico.

Beneficios

- Permite que la herida se drene hacia un apósito absorbente.
- Minimiza el deshilado cuando el apósito se recorta al tamaño y forma de la herida.
- 3. Reduce el dolor en los recambios al ser suave y de baja adherencia.
- Al retirar el apósito, se realiza de manera atraumática.
- 5. Protege la herida al utilizarse como interfase.
- 6. Compatible con cualquier tipo de medicamento tópico.
- 7. Reduce el riesgo de infección.
- 8. El antimicrobiano no es afectado por la sangre o el
- 9. Efectivo contra bacterias gram negativo y gram positivo, SARM, entre otros.

Composición:

Malla: fibras de algodón Cubierta: impregnado de parafina

Antimicroniano: acetato de clorhexidina al 0.5%

Instrucciones

Bactigras™ debe aplicarse bajo supervisión médica. Utilice siempre técnicas asépticas

Preparación

- •Utilice los protocolos clínicos existentes para limpiar la herida.
- •Seleccione el apósito del tamaño y forma adecuados.
- •Compruebe que la piel alrededor de la herida esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes, quitando el exceso de humedad.

Aplicación del apósito

- •Recorte el apósito a la forma y tamaño de la herida.
- •Retire el papel protector que contiene al apósito.
- •Sujete el apósito y aplíquelo directamente en la herida. Frecuencia de cambio del apósito
- Como apósito primario para abrasiones, escaldaduras menores, sitios donares e injertos, el cambio debe realizarse cada 24 horas.
- •Como apósito de interfase, debe realizarse de acuerdo al apósito secundario, por razones necesarias.

Apósito de gasa parafinada impregnada con Clorhexidina al 0.5%

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Código EAN
7456	5 x 5 cm	50	05000223074562
7457	10 x 10 cm	10	05000223074579
7461	15 x 20 cm	10	05000223074616
66007505	15 x 100 cm	Rollo	05000223075057

Re. San.: INVIMA 2014DM-000732-R3

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE 00356	LATEX FREE	STERILE R	<u>∑</u> (2)	Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2B
Clase CE III, estéril			3 años	
Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008			* 6	
TUY OF THE PROPERTY OF THE PRO				Distribuidor Smith & Nephew, SAU



No contiene látex





Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante



STERILE R

Producto esterilizado por irradiación

No reutilizar



Temperatura de almacenamiento

No utilizar si el envase está abierto odañado

Smith&Nephew Colombia SAS Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá Tel: 57 (1) 605 7373 www.smith-nephew.com

™Marca registrada Smith&Nephew