

FICHA TÉCNICA No. FTA-003V04

Frebini Energy Fibre Drink



NOMBRE COMERCIAL

Alimento para propósitos médicos especiales. Fórmula polimérica, para alimentación vía oral o por sonda, hipercalórica 1.5 kcal/mL, normoproteica. A base de maltodextrina, lípidos y proteína láctea (caseina y proteína whey). Contiene taurina, carnitina e inositol, fibra soluble, vitaminas y minerales. Para el manejo nutricional de personas de 1 a 12 años, con retardo del desarrollo con o sin desnutrición proteicocalórica, parálisis cerebral, enfermedad de Crohn, y cáncer del tracto gastrointestinal con incapacidad para suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. Marca Frebini Energy Fiber Drink®.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

EasyBottle de 200 mL.

CARACTERÍSTICAS

- Alto en energía (150 Kcal / 100 mL). Contribuye con el requerimiento calórico de los pacientes con necesidades energéticas elevadas.
- Calorías y proteínas adecuadamente equilibradas.

Página:

- Con mezcla de fibras, incluyendo fibra prebiótica (Inulina).
- Delicioso sabor a Vainilla.
- Botella de 200 mL, con fácil agarre para los niños, incluye pitillo.

Documento Anexo No:

A6-SOP-MU-AR-001

04. Ene. 2021

Versión:

Fecha de Publicación: 12 Ene 2021 Fecha de Creación:

Página 1 de 7



Vía de administración

Oral o enteral

Porción: A ser determinada por el profesional de la salud de acuerdo a las necesidades de cada persona.

- Para una nutrición suplementaria se recomiendan de 1 a 3 botellas al día
- Para una nutrición completa se recomiendan de acuerdo a la edad del paciente:

1-3 años: 3 a 4 botellas al día.
4-6 años: 5 a 6 botellas al día.
7-10 años: 6 a 7 botellas al día.
11-12 años: 7 a 8 botellas al día.

Importante

- Usar únicamente bajo supervisión médica.
- Asegurar una ingesta adecuada de líquidos.

INGREDIENTES

DOSIS Y VÍA DE

ADMINISTRACIÓN

Agua, maltodextrina, aceite de canola, proteína de leche, sacarosa, triglicéridos de cadena media (TCM), inulina, celulosa, emulsificante (E471, lecitina de soya), fosfato dipotásico, cloruro de potasio, citrato de sodio, saborizante, cloruro de sodio, dextrina de trigo, tartrato de colina, vitamina C, oxido de magnesio, mio-inositol, taurina, regulador de acidez, sulfato de hierro, sulfato de zinc, L-carnitina, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, cloruro de manganeso, vitamina B2, vitamina B1, sulfato de cobre, vitamina B6, fluoruro de sodio, betacaroteno, vitamina A, ácido fólico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, biotina, selenita de sodio, yoduro de potasio, vitamina K1, vitamina D3, vitamina B12.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Nutrientes Principales				
	Unidad de medida	100 mL 200 ml		
Calorías	Kcal	150 300		
Densidad calórica	Kcal/mL	1.5 3		
Agua	mL	79	158	
Osmolaridad	mOsmol/L	400		
Osmolalidad	mOsmol/kg H2O	500		
Proteína (10.2% VCT)	g	3.8	7.6	
Relación Caseína: Whey	%	80:20		
Grasa (40% VCT)	g	6.7 13.4		
Triglicéridos de cadena larga (TCM)	g	1.3	2.6	

Documento Anexo N°: A6-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 04. Ene. 2021 Versión: 02 Página: Página 2 de 7



Ácidos grasos saturados	g	0.4	0.8
Ácidos grasos monoinsaturados	g	3.3	6.6
Ácidos grasos poliinsaturados	g	1.7	3.4
EPA	g	-	-
DHA	g	-	-
Ácidos grasos n6/n3	g	2.3/1	
Colesterol	mg	≤3	≤6
Carbohidratos (48.3% VCT)	g	18.1	36.2
Fibra dietaría (1.5% VCT)	g	1.1	2.2
Vitaminas	, Minerales y I	Elementos Tra	ıza
	Unidad de medida	100 mL	200 mL
Vit. A	μg RE	68	136
β- caroteno	μg	150	300
Total Vit. A	μg RE	93	186
Vit. D3	μg	1.13	2.26
Vit. E	mg aTE	3	6
Vit. K1	μg	6	12
Vit. B1	mg	0.3	0.6
Vit. B2	mg	0.3	0.6
Niacina	mg	1.8	3.6
Vit. B6	mg	0.17	0.34
Vit. B12	μg	0.3	0.6
Ácido Pantoténico	mg	0.6	1.2
Biotina	μg	7.5	15
Ácido Fólico	μg	33	66
Vit. C	mg	12	24
Colina	mg	30	60
Mio-inositol	mg	22.5	45
Carnitina	mg	4.5	9
Taurina	mg	12	24
Sodio	mg	81	162
Potasio	mg	150	300
Cloruro	mg	123	246
Calcio	mg	105	210

Documento Anexo N°: A6-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 04. Ene. 2021 Versión: 02 Página: Página **3** de **7**



Fósforo	mg	92	184	
Magnesio	mg 19 38			
Hierro	mg	3		
Zinc	mg	1.5	3	
Cobre	μg	150	300	
Manganeso	mg	0.18	0.36	
Yodo	μд	15	30	
Fluor	mg	0.12	0.24	
Cromo	μg	6	12	
Molibdeno	μд	6	12	
Selenio	μд	4.5	9	
Fuente de los nutrientes				
Proteína	Р	roteína de lech	е	
Carbohidratos	Maltodextrina, sacarosa			
Grasas	Aceite de canola, TCM			
Fibra dietaría	Inulina, MCC, dextrina de trigo			
Datos Relevantes				
Colesterol Clínicamente libre (≤50 mg/RDD)				
Lactosa	Clínicamente libre (≤ 6 g/RDD)			
Purina	Clínicamente libre (≤ 50 mg/RDD)			
Gluten	Libre de gluten (≤ 20 mg/kg)			
Fibra	Contiene fibra (<15 g/RDD)			
Sodio	Bajo en sodio (≤ 120 mg/100 g)			
Composición de carbohidratos				
	Unidad de medida	100 mL	200 mL	
Glucosa	g	0.31	0.62	
Fructosa	g	0.03	0.06	
Galactosa	g	0.12	0.24	
Maltosa	9 0.8		1.6	
Sacarosa	g			
Lactosa	9 ≤0.05		≤0.10	
Oligo y	<u> </u>	13.63	27.26	
Polisacáridos	g	13.03		
	g g	-	-	
Polisacáridos				

Documento Anexo N°: A6-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 04. Ene. 2021 Versión: 02 Página: Página 4 de 7



	Unidad de medida	100 mL	200 mL	
Ácido caproico	g	0.002	0.004	
Ácido caprílico	g	0.73	1.46	
Ácido cáprico	g	0.5	1	
Ácido laurico	g	0.004	0.008	
Ácido miristico	g	ı	-	
Ácido palmítico	g	0.25	0.5	
Ácido palmitoleico	g	ı	-	
Ácido esteárico	g	0.11	0.22	
Ácido oleico	g	3.06	6.12	
Ácido linoleico	g	1.11	2.22	
Ácido a-linoleico	g	0.48	0.96	
Ácido eicosapentaenoico	g	-	-	
Ácido docosahexaenoico	g	-	-	
Otros ácidos grasos ω-3 de pescado	g	-	-	
Aminoácidos				
	Unidad de medida	100 mL	200 mL	
Lisina				
	g	0.32	0.64	
Treonina	g g	0.32 0.18	0.64 0.36	
Treonina Metionina				
	g	0.18	0.36	
Metionina	g g	0.18 0.11	0.36 0.22	
Metionina Fenilalanina	g g g	0.18 0.11 0.19	0.36 0.22 0.38	
Metionina Fenilalanina Triptofano	9 9 9 9	0.18 0.11 0.19 0.05	0.36 0.22 0.38 0.1	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina	g g g g	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina Leucina	9 9 9 9 9	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27 0.38	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54 0.76	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina Leucina Isoleucina	9 9 9 9 9 9	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27 0.38 0.2	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54 0.76	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina Leucina Isoleucina Tirosina	g g g g g g	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27 0.38 0.2 0.2	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54 0.76 0.4 0.4	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina Leucina Isoleucina Tirosina Cisteína	g g g g g g g	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27 0.38 0.2 0.2 0.03	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54 0.76 0.4 0.4 0.06	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina Leucina Isoleucina Tirosina Cisteína Taurina	g g g g g g g	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27 0.38 0.2 0.2 0.03 0.012	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54 0.76 0.4 0.4 0.06 0.024	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina Leucina Isoleucina Tirosina Cisteína Taurina Histidina	9 9 9 9 9 9 9	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27 0.38 0.2 0.2 0.03 0.012	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54 0.76 0.4 0.4 0.06 0.024 0.24	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina Leucina Isoleucina Tirosina Cisteína Taurina Histidina Arginina	g g g g g g g g	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27 0.38 0.2 0.2 0.03 0.012 0.12 0.16	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54 0.76 0.4 0.4 0.06 0.024 0.24 0.32	
Metionina Fenilalanina Triptofano Valina Leucina Isoleucina Tirosina Cisteína Taurina Histidina Arginina Glutamina	g g g g g g g g g	0.18 0.11 0.19 0.05 0.27 0.38 0.2 0.2 0.03 0.012 0.12 0.16 0.34	0.36 0.22 0.38 0.1 0.54 0.76 0.4 0.06 0.024 0.24 0.32 0.68	

Documento Anexo N°: A6-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 04. Ene. 2021 Versión: 02 Página: Página **5** de **7**



		Serina	g	0.23	0.46	
		Ácido Glutámico	g	0.49	0.98	
		Ácido aspártico y asparagina	g	0.31	0.62	
		ivalente de retinol.				•
INDICACIONES	 TE=Equivalente de tocoferol. Para el manejo nutricional de personas de 1 a 12 años, con retardo del desarrollo con o sin desnutrición proteicocalórica, parálisis cerebral, enfermedad de Crohn, y cáncer del tracto gastrointestinal con incapacidad para suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. Contraindicaciones No es adecuado para niños menores de 1 año, o para pacientes adultos. No apto para galactosémicos. No utilizar por vía parenteral. No es adecuado en casos donde la nutrición enteral no está permitida, por ejemplo durante el sangrado gastrointestinal agudo, íleo o shock. Se recomienda precaución en casos de falla orgánica severa con alteración del metabolismo y en formas severas de malasimilación. No es adecuado para el uso en pacientes con inhabilidad congénita para metabolizar los nutrientes presentes en Frebini Energy Fibre Drink. 					
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	Doce (12) meses en condiciones normales de almacenamiento y uso.					
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura entre 15°C y 25°C. Una vez abierto, usar dentro de 24 horas. Agitar bien antes de usar.					
FABRICANTE	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con domicilio en Alemania.					
TITULAR	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con domicilio en Alemania.					
PAÍS DE ORIGEN	Alemania					
REGISTRO SANITARIO INVIMA	RSA-002940-2017					
IMPORTADOR Y/O DISTRIBUIDOR EN COLOMBIA	Fresenius Kabi Colombia S.A.S. Bogotá D.C., Colombia.					

Documento Anexo N°: A6-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 04. Ene. 2021 Versión: 02 Página: Página 6 de 7



Daniel Sneyder Rios Sandoval Analista Jr. de Asuntos	Jaqueline Osorno Gerente de Producto	Luis Carlos García Melo
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

Documento Anexo N°: A6-SOP-MU-AR-001 Fecha de Creación: 04. Ene. 2021 Versión: 02 Página: Página 7 de 7