Preparación



Lávese las manos antes de preparar la fórmula infantil.



Lave bien los recipientes y todos sus accesorios hasta que no quede ningún residuo de fórmula anterior.



Hiérvalos durante 5 minutos, escúrralos. Manténgalos tapados hasta su uso.



Hierva aqua potable durante 5 minutos; déjela entibiar.



Consulte la tabla de alimentación; vierta la cantidad exacta de aqua tibia en el recipiente previamente hervido.



Use exclusivamente la medida que se encuentra en el interior de la lata y añada el número exacto de medidas rasas según la edad del bebé. (Consulte la tabla de alimentación o la indicación dada por su pediatra).



Mezcle bien hasta que el polvo se disuelva completamente.



Cierre bien la lata después de cada uso y almacene en un lugar fresco



AVISO IMPORTANTE:

CO) La leche materna es el mejor alimento para el niño. La lactancia materna debería continuar por el mayor tiempo posible. El consumo de este producto debe ser indicado por un profesional de la salud. VE) La leche materna es el mejor alimento para los niños y niñas lactantes hasta los dos años de edad. Este producto solo debe utilizarse cuando así lo recomiende un pediatra. La cantidad del producto necesaria para alimentar adecuadamente al niño o niña lactante solo puede indicarla el pediatra.

Advertencia:

Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, éste o cualquier otro alimento es perjudicial para la salud del niño. El uso de agua y utensilios sin hervir, o la reconstitución incorrecta del producto pueden ocasionar una enfermedad al behé Un almacenaje, manejo, preparación y alimentación incorrecta pueden ocasionar eventualmente efectos adversos en la salud del bebé. Este producto no es estéril, Nutricionalmente completa y adecuada como única fuente de nutrición para los niños en condiciones alimentarias especiales. No le introduzca la cuchara medidora húmeda a la lata. La fórmula infantil no debe calentarse en el horno microondas.

ALFARÉ® sólo debe utilizarse bajo indicación y supervisión médica.

Utilizar vía oral, no utilizar por vía parenteral. No usar en caso de galactosemia, malabsorción de glucosa-galactosa.

Ingredientes

Maltodextrina, Proteína de suero de leche extensamente hidrolizada, Mezcla de aceites vegetales (Aceite de canola, Aceite de Girasol, Aceite de Girasol alto en ácido oleico, Aceite de coco). Triglicéridos de cadena media (TCM) (10%), Almidón de papa, Mezcla de aceites (Aceite de canola, Aceite de Girasol alto en ácido oleico, Aceite de mortierella alpina [DHA], Aceite de Schizochytrium(ARA)), Glicerofosfato de Calcio, Emulsionante (Ésteres de ácido cítico con mono y diglicéridos), Oligosacáridos (2'-Fucosillactosa, Lacto-N-Neotetraosa), Fosfato de Potasio, Regulador de acidez (Ácido cítrico), Vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitaminas Cásidas de Acido cítrico), Vitaminas y minerales (Maltodextrina, Vitaminas Vita (ácido ascórbico), Inositol, Taurina, Vitamina E (D,L-alfa-tocoferil acetato), Nicotinamida, Pantotenato de Calcio, Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina A (Acetato de retinol), Vitamina B1 (Tigmina pagasaria de la Potació Acido (Tiamina mononitrato), Vitamina B6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido Fólico, Vitamina R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido Fólico, Vitamina R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Ácido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Acido R6 (Piridoxina), Sulfato de Manganeso, Voduro de Potasio, Acido R6 (Piridoxina), Sulfato R6 (Piridoxina Fólico, Vitamina K1 (Fitomenadiona), Biotina, Selenato de Sodio, Vitamina D3 (Colecalcieu), Vitamina P12 (Colecalcieu), Culfett ferniso. Vitamina B12 (Cianocobalamina)), Mezcla de minerales (Jarabe de glucosa, Sulfato ferriso, Sulfato de Zino Colorio de Sodo. Sulfato de Zinc, Sulfato de Cobre), Cloruro de Magnesio, Cloruro de Calcio, Cloruro de Sodo, Bitartrato de Colina Mudafata (CASA VIVI de Magnesio, Cloruro de Calcio, Cloruro de Calcio, Cloruro de Calcio, Cloruro de Sodo, Bitartrato de Colina Mudafata (CASA VIVI de Magnesio, Cloruro de Calcio, Cloruro de Sodo, Bitartrato de Colina Mudafata (CASA VIVI de Magnesio, Cloruro de Calcio, Cloruro de Sodo, Bitartrato de Calcio, Bit Bitartrato de Colina, Nucleótidos (CMP, UMP, AMP, GMP), Cloruro de Potasio, L-Carmitina.

Consérvese en un lugar fresco y seco. Una vez abierta la lata consérvela con la tapa bien cerrada. No se dobe extrata la lata consérvela con la tapa bien cerrada. cerrada. No se debe administrar el contenido de esta lata 3 semanas después de abierta. Si esta producta a contenido de esta lata 3 semanas después de abierta. Si esta producta successiva de la contenido de esta lata 3 semanas después de abierta. de abierta. Si este producto cambia de color, olor y apariencia debe desechase. El almacenamiento professora cambia de color, olor y apariencia debe desechase.

