ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FICHA TECNICA



Nombre Genèrico: HIDROXICINA

Nombre Comercial: HIDROXICINA 25 MG TABLETAS RECUBIERTAS

Concentraciòn: 25 MG

Titular del Registro Sanitario: GENFAR S.A.

Fabricante: FAREVA VILLA RICA S.A.S.

DATOS DEL PRINCIPIO ACTIVO

Nombre Quimico Especifico: (RS)-2-{2-[4-(p-Chloro-a-phenylbenzyl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethanol

Formula Molecular: C21H27ClN2O2

Peso Molecular: 374.9 g/mol

No de CAS: 68-88-2

Contraindicaciones:

DATOS DEL PRODUCTO TERMINADO

Indicaciones: ANTIHISTAMINICO, SEDANTE, HIPNÓTICO.

HIPERSENSIBILIDAD A LOS COMPONENTES. ADMINISTRACIÓN
CONCOMITANTE CON ALCOHOL Y OTROS DEPRESORES DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL, EN EMBARAZO Y LACTANCIA. ADMINÍSTRESE CON
PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON GLAUCOMA DE ÁNGULO ESTRECHO,
HIPERTENSIÓN, HIPERTIROIDISMO, ÚLCERA PÉPTICA, ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES O HIPERTROFIA PROSTÁTICA. PUEDE PRODUCIR
SOMNOLENCIA, POR LO TANTO DEBE EVITARSE ACTIVIDADES QUE
REQUIERAN ÁNIMO VIGILANTE, NO CONDUCIR VEHICULOS NI OPERAR
MAQUINARIA. EL USO DE HIDROXICINA ESTÁ CONTRAINDICADO EN
PACIENTES CON: PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT CONGÉNITO O
ADQUIRIDO; FACTORES DE RIESGO PREDISPONENTES PARA LA
PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT (POR EJ. ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR PREEXISTENTE, HISTORIA FAMILIAR DE MUERTE SÚBITA,
ALTERACIONES DEL BALANCE ELECTROLÍTICO COMO HIPOMAGNESEMIA E

ALTERACIONES DEL BALANCE ELECTROLITICO COMO HIPOMAGNESEMIA E HIPOKALIEMIA, BRADICARDIA SIGNIFICATIVA Y USO CONCOMITANTE DE MEDICAMENTOS CON POTENCIAL RECONOCIDO PARA PRODUCIR

PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT DEL ELECTROCARDIOGRAMA O TORSADE DE POINTES). ADVERTENCIAS: NO SE RECOMIENDA UTILIZAR HIDROXICINA EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA. EN CASO QUE SE REQUIERA SU USO EN ESTE TIPO DE PACIENTES, LA DOSIS MÁXIMA DIARIA NO DEBE SUPERAR LOS

50 MG; SE DEBE ADMINISTRAR HIDROXICINA EN LA DOSIS EFICAZ MÁS BAJA Y DURANTE EL MENOR TIEMPO POSIBLE. LAS DOSIS MÁXIMAS DIARIAS NO DEBEN SUPERAR: EN ADULTOS:100 MG/DÍA; EN NIÑOS DE HASTA 40 KG DE PESO: 2 MG/KG/DÍA; SE DEBE INFORMAR A LOS PACIENTES CONTACTEN A SU MÉDICO TRATANTE SI DURANTE EL TRATAMIENTO CON HIDROXICINA EXPERIMENTAN SÍNTOMAS COMO SÍNCOPE, TAOUICARDIA, PALPITACIONES

CUANDO SE ADMINISTRE HIDROXIZINA JUNTO A OTROS MEDICAMENTOS CON CAPACIDAD PARA PRODUCIR HIPOKALIEMIA Y/O BRADICARDIA.

O DISNEA. PRECAUCIONES: DEBERÁ TENERSE ESPECIAL PRECAUCIÓN

Condiciones de Almacenamiento: MANTENGASE EN LUGAR SECO A TEMPERATURAS INFERIORES A 30°C

1 de 2

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - FICHA TECNICA



Registro Sanitario: INVIMA 2021M-14400-R3

Modalidad del Registro Sanitario: FABRICAR Y VENDER

Vigencia del Registro Sanitario: 1/11/2026

Còdigo ATC: N05BB01

Presentación Comercial: Caja x 20 tabletas recubiertas en Blister PVC/ PVDC transparente/Aluminio.

Codigo CUM: 019907962-04

Vida Util: 24 meses

Condición de Venta: CON FORMULA FACULTATIVA

Còdigo de Barras: 7702605180981

Elaborado por: Balmiro A. Canedo Barraza

Fecha: 12.09.2022