



DUOLIP® 10/20 TABLETAS

DUOLIP 10/20 MG X 30 TABLETAS

Formula:

Cada tableta contiene EZETIMIBA 10mg + SIMVASTATINA 20mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2020M-0007723-R1

Fecha vencimiento Invima:

2025-11-20 00:00:00.000000

C_U_M:

19982664-3

Vida Util:

730

Indicaciones:

ALTERNATIVO EN AQUELLOS CASOS DE PACIENTES NO CONTROLADOS APROPIADAMENTE CON UNA ESTATINA O EZETIMIBA ADMINISTRADAS SOLAS.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA

Precauciones:

NO DEJE DE TOMAR SUS MEDICAMENTOS A MENOS QUE SU PROFESIONAL DE LA SALUD REVISE SU HISTORIAL MÉDICO, LA DOSIS PRESCRITA EN LA ACTUALIDAD DE LA SIMVASTATINA, Y UNA LISTA DE SUS MEDICAMENTOS ACTUALES PARA DETERMINAR SI LOS MEDICAMENTOS QUE ESTÁN TOMANDO SON LOS ADECUADOS. CONTACTE INMEDIATAMENTE CON SU PROFESIONAL DE LA SALUD SI EXPERIMENTA DOLOR MUSCULAR, SENSIBILIDAD O DEBILIDAD, ORINA DE COLOR OSCURO O ROJO, O CANSANCIO SIN EXPLICACIÓN. HABLE CON SU PROFESIONAL DE LA SALUD SOBRE CUALQUIER PREGUNTA O PREOCUPACIÓN QUE TENGA SOBRE LOS MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN SIMVASTATINA.

Contraindicaciones:

HIPERSENSIBILIDAD A CUALQUIER COMPONENTE DE ESTA PREPARACIÓN. EMBARAZO Y LACTANCIA. ENFERMEDAD HEPÁTICA ACTIVA O ELEVACIÓN INEXPLICABLE DE LAS TRANSAMINASAS SÉRICAS. NO UTILIZAR EL PRODUCTO SIMULTÁNEAMENTE CON INHIBIDORES POTENTES DEL CYP 450 COMO ITRACONAZOL, KETOCONAZOL, ERITROMICINA, CLARITROMICINA, TELITROMICINA, INHIBIDORES DE LA PROTEASA DEL VIH O NEFAZODONA, TAMPOCO DEBE ADMINISTRARSE CON GEMFIBROZILLO POR RIESGO DE MIOPATÍA. LOS PACIENTES CON TERAPIA DE ÁCIDO FUSÍDICO, WARFARINA O SIMVASTATINA DEBEN SER MONITORIZADOS CERCANAMENTE. NO INICIAR NUEVOS PACIENTES CON SIMVASTATINA 80 MG, INCLUYENDO AQUELLOS QUE TOMAN DOSIS MÁS BAJAS DE ÉSTE MEDICAMENTO.

Reacciones Adversas:

+(031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica

**Descripcion ATC:**

SIMVASTATINA COMBINACIONES PAQUETES

Codigo ATC:

C10AA51

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Laboratorio Fabricante:

Colompack S.A.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica