



LOTEMICIN®

LOTEMICIN SUSPENSION X 5 ML

Formula:

Cada 1ml de solucion contiene: LOTE Prednol Etabonato 5,0mg + Tobramicina Base 3,0mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2008M-0008239

Fecha vencimiento Invima:

2018-07-15 00:00:00.000000

C_U_M:

19987652-5

Vida Util:

730

Indicaciones:

TRATAMIENTO DE LAS AFECCIONES OCULARES INFLAMATORIAS QUE RESPONDEN A LOS CORTICOSTEROIDES Y DONDE EXISTE UNA INFECCIÓN BACTERIANA SOBRE LA SUPERFICIE OCULAR O RIESGO DE ELLA

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

NO INYECTAR. EL USO PROLONGADO DE CORTICOSTEROIDES PUEDE PRODUCIR GLAUCOMA CON DAÑOS EN EL NERVIÓPTICO, DEFECTOS EN LA AGUDEZA VISUAL Y EN EL CAMPO VISUAL; Y FORMACIÓN DE CATARATA SUBCAPSULAR POSTERIOR. LOS ESTEROIDES DEBEN SER UTILIZADOS CON PRECAUCIÓN EN LOS CASOS DE GLAUCOMA. ALGUNOS PACIENTES PUEDEN DESARROLLAR SENSIBILIDAD A LA APLICACIÓN TÓPICA DE AMINOGLUCÓSIDOS. SI SE PRODUCE UNA REACCIÓN DE SENSIBILIDAD, DISCONTINUAR EL USO. EL USO PROLONGADO DE CORTICOSTEROIDES PUEDE SUPRIMIR LA RESPUESTA DEL HUÉSPED Y AUMENTAR EL RIESGO DE INFECCIONES OCULARES SECUNDARIAS. EN AQUELLAS AFECCIONES QUE PROVOCAN UN ADELGAZAMIENTO DE LA Córnea O DE LA ESCLERA, EL USO DE ESTEROIDES TÓPICOS PUEDE CAUSAR PERFORACIONES. EN AFECCIONES OCULARES PURULENTAS AGUDAS, LOS ESTEROIDES PUEDEN OCULTAR O EXACERBAR LAS INFECCIONES EXISTENTES. EL USO DE ESTEROIDES OCULARES PUEDE PROLONGAR EL CURSO Y EXACERBAR LA SEVERIDAD DE NUMEROSAS INFECCIONES OCULARES VIRÓICAS (INCLUYENDO HERPES SIMPLE). EL USO DE CORTICOSTEROIDES EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON UNA HISTORIA DE HERPES SIMPLE REQUIERE GRAN PRECAUCIÓN. EL USO DE ESTEROIDES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE CATARATA PUEDE RETRASAR LA CICATRIZACIÓN Y AUMENTAR LA INCIDENCIA DE FORMACIÓN DE AMPOLLAS. ES RECOMENDABLE DETERMINAR LA PRESIÓN INTRAOCULAR SI SE ADMINISTRA LOTEMICIN® DURANTE 10 DÍAS O MÁS TIEMPO.

Contraindicaciones:

CONTRAINDICADO EN ENFERMEDADES VIRALES DE LA Córnea Y DE LA CONJUNTIVA, INCLUYENDO LA QUERATITIS EPITEAL POR HERPES SIMPLE (QUERATITIS DENDRÍTICA). VACCINIA, VARICELA: TAMBIÉN EN INFECCIONES OCULARES POR MICROBACTERIAS Y EN AFECCIONES MIOGÉNICAS. LAS ESTRUCTURAS OCULARES. HIPERSENSIBILIDAD A LOS COMPONENTES DE LA FÓRMULA.

+57 (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica

**Reacciones Adversas:**

.

Descripcion ATC:

TOBRAMICINA

Codigo ATC:

S01AA12

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Laboratorio Fabricante:

LABORATORIOS POEN S.A.U.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica