

ARAMAX 50/2.5 MG CAPSULAS

ARAMAX 2.5/50 X 30 CAPSULAS

\mathbf{F}_{i}	۸r	m	ml	la '
	.,.			

Cada cápsula dura contiene Losartan Potásico 50 mg, Amlodipino Besilato equivalente a Amlodipino base 2.5 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2019M-0009710-R1

Fecha vencimiento Invima:

2024-09-11 00:00:00.000000

C U M:

19999985-02

Vida Util:

730

Indicaciones:

TRATAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA

Precauciones:

ADVERTENCIAS: NO UTILIZAR TERAPIA COMBINADA CON MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SRA (IECA, ARA II O ALISKIRENO), EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS QUE SE CONSIDERE IMPRESCINDIBLE. EN ESTOS CASOS, EL TRATAMIENTO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN MEDICO CON EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE ESTE TIPO DE PACIENTES, VIGILANDO ESTRECHAMENTE LA FUNCIÓN RENAL, EL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO Y LA TENSIÓN ARTERIAL. PRECAUCIONES: NO SE RECOMIENDA EL USO DE LA TERAPIA COMBINADA DE IECA CON ARA II, EN PARTICULAR EN PACIENTES CON NEFROPATÍA DIABÉTICA.

Contraindicaciones:

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: EN PACIENTES QUE PRESENTAN HIPERSENSIBILIDAD AL AMLODIPINO, AL LOSARTAN POTÁSICO O A LOS DEMÁS COMPONENTES DE LA FÓRMULA. INFORME A SU MÉDICO SOBRE CUALQUIER MEDICAMENTO QUE ESTÉ USANDO, ANTES DE COMENZAR O DURANTE EL TRATAMIENTO. EMBARAZO Y LACTANCIA. PACIENTES CON HIPERPOTASEMIA. EN PACIENTES QUE NECESITEN CIRUGÍA CON ANESTESIA GENERAL. PACIENTES PORTADORES DE ESTENOSIS DE LA ARTERIAL RENAL. LA COMBINACIÓN DE ALISKIRENO CON IECA O ARA II EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL MODERADA-GRAVE O DIABETES ESTÁ CONTRAINDICADA.

Reacciones Adversas:



LOSARTAN Y AMLODIPINO

Codigo ATC:

C09DB06

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a $30^{\circ}\mathrm{C}.$

Laboratorio Fabricante:

Colompack S.A