



ARAMAX 5/100mg CAPSULAS

ARAMAX 5/100 X 30 CAPSULAS

Formula:

Cada cápsula dura contiene Losartán Potásico 100 mg, Amlodipino Besilato equivalente a Amlodipino Base 5 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Registro Invima:

INVIMA 2019M-0009345-R1

Fecha vencimiento Invima:

2024-07-15 00:00:00.000000

C_U_M:

19999986-02

Vida Util:

730

Indicaciones:

Tratamiento de la presión arterial.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA.

Precauciones:

PRECAUCIONES: NO SE RECOMIENDA EL USO DE LA TERAPIA COMBINADA DE IECA CON ARA II, EN PARTICULAR EN PACIENTES CON NEFROPATÍA DIABÉTICA. ADVERTENCIAS: NO UTILIZAR TERAPIA COMBINADA CON MEDICAMENTOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SRA (IECA, ARA II O ALISKIRENO), EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS QUE SE CONSIDERE IMPRESCINDIBLE. EN ESTOS CASOS, EL TRATAMIENTO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN MÉDICO CON EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE ESTE TIPO DE PACIENTES, VIGILANDO ESTRECHAMENTE LA FUNCIÓN RENAL, EL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO Y LA TENSIÓN ARTERIAL. LA SEGURIDAD DE AMLODIPINO DURANTE EL EMBARAZO O LACTANCIA NO SE HA ESTABLECIDO. DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN CONCOMITANTE DE INDUCTORES DEL CYP3A4, LA CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE AMLODIPINO PUEDE VARIAR. POR LO ANTERIOR, LA PRESIÓN ARTERIAL DEBE SER MONITOREADA Y LA REGULACIÓN DE LA DOSIS CONSIDERADA DURANTE Y DESPUÉS DE LA MEDICACIÓN CONCOMITANTE, PARTICULARMENTE CON INDUCTORES FUERTES DEL CYP3A4 (POR EJEMPLO RIFAMPICINA). UN ESTUDIO CLÍNICO EVIDENCIÓ QUE EL AMLODIPINO SE TRANSFIERE A LA LECHE MATERNA. LA DECISIÓN SOBRE CONTINUAR O INTERRUMPIR LA LACTANCIA MATERNA, O CONTINUAR VS INTERRUMPIR EL TRATAMIENTO CON AMLODIPINO DEBE HACERSE TENIENDO EN CUENTA EL RIESGO BENEFICIO DE LA LACTANCIA PARA EL NIÑO Y DEL TRATAMIENTO CON AMLODIPINO PARA LA MADRE.

Contraindicaciones:

En pacientes que presentan hipersensibilidad al Amlodipino, al Losartán potásico, o a los demás componentes de la fórmula. Informe a su médico sobre cualquier medicamento que esté usando antes de comenzar o durante el tratamiento. Embarazo y lactancia. Pacientes con hiperpotasemia. En pacientes que necesiten cirugía con anestesia general. Pacientes portadores de estenosis de la arteria renal. La combinación de Aliskireno con IECA o ARA II en pacientes con insuficiencia renal moderada-grave. Los demás están contraindicados.

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



Reacciones Adversas:

Descripcion ATC:

LOSARTAN Y AMLODIPINO

Codigo ATC:

C09DB06

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Laboratorio Fabricante:

Colompack S.A.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica