



DUOVAL H 5/160/12,5 MG X 30 TAB

DUOVAL H 5/160/12,5 MG X 30 TAB

Formula:

Cada comprimido contiene: Valsartan 160 mg, Amlodipino Besilato 6,93 mg equivalente a 5 mg de Amlodipino base, Hidroclorotiazida 12,5 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Registro Invima:

INVIMA 2016M-0017300

Fecha vencimiento Invima:

2021-09-22 00:00:00.000000

C_U_M:

20101547-8

Vida Util:

730

Indicaciones:

MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL QUE HA LOGRADO CONTROLARSE CON LA COMBINACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS FÁRMACOS DEL PRODUCTO PROPUESTO.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: BLOQUEO DOBLE DEL SISTEMA RENINO-ANTIOTENSÍNICO (SRA) SE REQUIERE CAUTELA A LA HORA DE ADMINISTRAR SIMULTÁNEAMENTE ARA COMO EL VALSARTÁN, CON OTROS AGENTES BLOQUEANTES DEL SRA, COMO LOS IECAS O EL ALISKIRENO. INTERACCIONES BLOQUEO DOBLE DEL SISTEMA RENINO-ANGIOTENSÍNICO (SRA) CON ARA, IECAS O ALISKIRENO: EL USO CONCOMITANTE DE ARA, COMO EL VALSARTÁN, CON OTROS AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SRA SE ASOCIA A UNA MAYOR INCIDENCIA DE HIPOTENSIÓN, HIPERPOTASEMIA Y ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN RENAL EN COMPARACIÓN CON LA MONOTERAPIA. SE RECOMIENDA VIGILAR LA TENSIÓN ARTERIAL, LA FUNCIÓN RENAL Y LOS ELECTRÓLITOS EN LOS PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON EXFORGE HCT Y OTROS AGENTES QUE AFECTAN AL SRA. DEBE EVITARSE EL USO SIMULTÁNEO DE ARA, COMO EL VALSARTÁN, O DE IECAS CON ALISKIRENO EN PACIENTES CON DISFUNCIÓN RENAL GRAVE (FILTRACIÓN GLOMERULAR < 30 ML/MIN). EL USO SIMULTÁNEO DE ARA, COMO EL VALSARTÁN, O DE IECAS CON ALISKIRENO ESTÁ CONTRAINDICADO EN PACIENTES CON DIABETES DE TIPO II.

Contraindicaciones:

CONTRAINDICACIONES: HIPERSENSIBILIDAD AL AMLODIPINO, EL VALSARTÁN, LA HIDROCLOROTIAZIDA, OTRAS SULFONAMIDAS, Ó A DERIVADOS DE DIHIDROPIRIDINA, Ó A CUALQUIERA DE LOS EXCIPIENTES DE ESTE MEDICAMENTO. EXFORGE® HCT ESTÁ CONTRAINDICADO EN EL EMBARAZO. DEBIDO A LA HIDROCLOROTIAZIDA, EXFORGE HCT ESTÁ CONTRAINDICADO EN PACIENTES AFECTADOS DE INSUFICIENCIA HEPÁTICA GRAVE, INSUFICIENCIA RENAL GRAVE (DEPURACIÓN DE CREATININA INFERIOR A 30ML/MIN.), ANURIA, HIPOPOTASEMIA REFRACTARIA, HIPERKALEMIA, HIPERCALCEMIA E HIPERURICEMIA SINTOMÁTICA. USO SIMULTÁNEO DE ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA ANGIOTENSINA (ARA) CON ALISKIRENO, O EL VALSARTÁN, O DE INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERSORA DE LA ANGIOTENSINA (IECA) CON ALISKIRENO.

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



TIPO II.

Reacciones Adversas:

.

Descripcion ATC:

VALSARTAN, AMLODIPINA E HIDROCLOROTIAZIDA

Codigo ATC:

C09DX01

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Laboratorio Fabricante:

Laboratorios Rowe SRL

+(031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica