



TRACTAL 2

TRACTAL 2 MG X 30 CREC

Formula:

Cada comprimido contiene Risperidona 2 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Registro Invima:

INVIMA 2020M-0000893-R2

Fecha vencimiento Invima:

2026-01-29 00:00:00.000000

C_U_M:

19926483-7

Vida Util:

1095

Indicaciones:

Alternativo en el tratamiento de esquizofrenia aguda y crónica. Monoterapia en desorden bipolar. Tratamiento de desórdenes de la conducta en niños, adolescentes y adultos con retardo mental. Coadyuvante a corto y mediano plazo en el manejo de la enfermedad de autismo.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

DEMENCIA ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: RIESGO DE LEUCOPENIA, NEUTROPENIA Y AGRANULOCITOSIS. SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES TRATADOS CON RISPERIDONA. USAR CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR CONOCIDA. EL CONSUMO DE ESTOS MEDICAMENTOS PUEDE EXACERBAR UNA DIABETES PREEXISTENTE O DE PRODUCIR TRASTORNOS METABÓLICOS COMO HIPERGLUCEMIA O HIPERGLICEMIA. AUNQUE NO SON MUCHOS LOS CASOS REPORTADOS DE IMPOTENCIA SEXUAL, DE LLEGAR A PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA, INFÓRMELO A SU MÉDICO TRATANTE. SU VENTA DEBE SER BAJO FÓRMULA MÉDICA Y QUE DEBE USARSE BAJOESTRICTA VIGILANCIA MÉDICA. ESTE MEDICAMENTO CONTIENE LACTOSA. LOS PACIENTES CON PROBLEMAS HEREDITARIOS RAROS DE INTOLERANCIA A LA GALACTOSA, DEFICIENCIA DE LACTASA LAPP O MALABSORCIÓN DE GLUCOSA-GALACTOSA NO DEBEN TOMAR ESTE MEDICAMENTO.

Contraindicaciones:

HIPERSENSIBILIDAD A LA RISPERIDONA, EMBARAZO Y LACTANCIA. PUEDEPRODUCIR HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA E INTERFERIR CON ACTIVIDADES QUE REQUIERAN AGUDEZA VISUAL. PUEDE INTERACTUAR CON OTROS DEPRESORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. PUEDE ANTAGONIZAR LOS EFECTOS DE LA LEVODOPA Y OTROS AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS. SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES CEREBROVASCULARES EN PACIENTES TRATADOS CON RISPERIDONA.

Reacciones Adversas:

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



Las reacciones adversas que se observaron más frecuentemente en los ensayos clínicos con Risperidona fueron: insomnio, agitación, ansiedad y cefalea. Raramente se observaron: somnolencia, fatiga, mareos, falta de concentración, constipación, dispepsia, náuseas, dolor abdominal, visión borrosa, disfunción sexual, rinitis, rash cutáneo. Los efectos colaterales parkinsonianos son usualmente menos frecuentes que con otros neurolépticos, cuando aparecieron fueron leves y reversibles luego de la reducción de la dosis y/o la administración de medicación antiparkinsoniana. Ocasionalmente, se observó hipotensión ortostática, mareos ortostáticos y taquicardia refleja, particularmente con dosis iniciales altas. La Risperidona elevó los niveles plasmáticos de prolactina, dando lugar a manifestaciones asociadas, como amenorrea, galactorrea y menorragia.

Descripcion ATC:

RISPERIDONA

Codigo ATC:

N05AX08

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Laboratorio Fabricante:

Mega Labs S.A.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica