

OFTAFLOX® GOTAS.

OFTAFLOX GOTAS X 5 ML

Formula:

Cada mL (25 gotas por mL) de suspensión contiene Polimixina B Sulfato (equivalente a 6000 UI) 1 mg, Neomicina Sulfato (equivalente a Neomicina Base 2.1 mg) 3.5 mg, Dexametasona Base 1 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Almacenar a temperatura menor a 30°C, en su empaque y envase original, proteger de la luz y el calor. No usar después de 28 días de abierto.

Registro Invima:

INVIMA 2021M-0004769-R2

Fecha vencimiento Invima:

2026-12-09 00:00:00.000000

C_U_M :

19953870-01

Vida Util:

730

Indicaciones:

Tratamiento de infecciones oculares causadas por microorganismos sensibles, estados inflamatorios oculares que responden a la corticoterapia tópica. Profiláctico en el post-operatorio quemaduras y penetración de cuerpos extraños.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA

Precauciones:

EL USO PROLONGADO PUEDE AUMENTAR LA PRESIÓN INTRAOCULAR. EN LAS CONDICIONES PURULENTAS AGUDAS DEL OJO, LOS ESTEREOIDES PUEDEN ENMASCARAR LA INFECCIÓN O REFORZAR LA INFECCIÓN EXISTENTE. EL PRESERVANTE CLORURO DE CLORURO DE BENZALCONIO PUEDE DEPOSITARSE EN LOS LENTES DE CONTACTO BLANDOS, ESTOS DEBEN COLOCARSE 15 MINUTOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL FÁRMACO.

Contraindicaciones:


Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula. Contraindicado en pacientes con herpes simple corneal, vaccinia, varicela y otras infecciones virales de la córnea y de la conjuntiva. Enfermedades micobacterianas del ojo. Enfermedades micóticas de las estructuras oculares.

Reacciones Adversas:

Descripcion ATC:

ANTIBIOTICOS EN COMBINACION CON OTROS F RMACOS

Codigo ATC:





S01AA20

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura menor a 30°C, en su empaque y envase original, proteger de la luz y el calor. No usar después de 28 días de abierto.

Laboratorio Fabricante:

Arbofarma S.A.S.