



# DORIXINA RELAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

DORIXINA RELAX X 100 COMP

## Formula:

Cada Tableta cubierta contiene CLONIXINATO DE LISINA 125mg + CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO 5mg

## Clasificación

Medicamento

## Almacenamiento

Manténgase fuera del alcance a de los niños. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30°C

## Registro Invima:

INVIMA 2020M-0000971-R2

## Fecha vencimiento Invima:

2025-12-28 00:00:00.000000

## C\_U\_M:

19908244-5

## Vida Util:

1095

## Indicaciones:

Dolor agudo de origen musculoesquelético cuando se acompaña de contractura muscular.

## Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

## Precauciones:

PRECAUCIONES PACIENTES CON RETENCIÓN URINARIA Y/O GLAUCOMA DEBE USARSE CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE RETENCIÓN URINARIA, GLAUCOMA DE ÁNGULO CERRADO, AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR Y EN PACIENTES QUE TOMAN MEDICAMENTOS ANTICOLINÉRGICOS. ELEVACIÓN DE LAS TRANSAMINASAS SE HA DESCRITO QUE OCASIONALMENTE DURANTE EL TRATAMIENTO SE PRODUCE UNA ELEVACIÓN DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE LAS TRANSAMINASAS O DE OTROS PARÁMETROS DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA. EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS EL AUMENTO SOBRE LOS NIVELES NORMALES ES PEQUEÑO Y TRANSITORIO. ALCOHOL U OTROS DEPRESORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) CICLOBENZAPRINA ESPECIALMENTE CUANDO SE USA CON ALCOHOL U OTROS DEPRESORES DEL SNC, PUEDE AFECTAR LAS CAPACIDADES MENTALES Y/O FÍSICAS REQUERIDAS PARA REALIZAR TAREAS PELIGROSAS, COMO OPERAR MAQUINARIA O CONDUCIR UN VEHÍCULO MOTORIZADO. ADVERTENCIAS NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE PRODUCTO POR MÁS DE 2 SEMANAS. CON LA CICLOBENZAPRINA, SE PUEDEN POTENCIAR LOS EFECTOS DEPRESORES DEL ALCOHOL, BARBITÚRICOS U OTROS DEPRESORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. EVITAR SU USO POR MÁS DE TRES SEMANAS. NO SE ACONSEJA SU USO EN ADULTOS MAYORES. NO CONDUCIR VEHÍCULOS NI MANEJAR MAQUINARIA PESADA.

## Contraindicaciones:

? Hipersensibilidad a alguno de los componentes. ? Hipertiroidismo. ? Fase aguda de recuperación del IAM, arritmias, bloqueos o alteraciones de la conducción, insuficiencia cardíaca congestiva. ? Uso concomitante con inhibidores de la MAO o dentro de los 14 días siguientes a su suspensión. ? Úlcera péptica activa o hemorragia gastroduodenal activa. ? Antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria ocasionados por el ácido acetil salicílico u otros AINEs. ? Postoperatorio de bypass coronario. Embarazo y Lactancia

## Reacciones Adversas:

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



**Descripcion ATC:**

CICLOBENZAPRINA

**Codigo ATC:**

M03BX08

**Almacenamiento:**

Manténgase fuera del alcance a de los niños. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30°C

**Laboratorio Fabricante:**

MEGALABS URUGUAY S.A.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica