



CEUMID COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1000 MG

CEUMID 1000 MG X 30

Formula:

Cada tableta recubierta contiene Levetiracetam 1000 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Registro Invima:

INVIMA 2020M-0010456-R1

Fecha vencimiento Invima:

2025-09-01 00:00:00.000000

C_U_M:

20007895-10

Vida Util:

1095

Indicaciones:

Alternativa o coadyuvante en epilepsias parciales con o sin generalización secundaria, refractarias a otros tratamientos en pacientes epilépticos adultos.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO: SI DEBE SUSPENDER LEVETIRACETAM SE RECOMIENDA RETIRARLO GRADUALMENTE (P.EJ. EN ADULTOS Y ADOLESCENTES QUE PESEN MÁS DE 50 KG: DECREMENTOS DE 500 MG DOS VECES AL DÍA CADA DOS A CUATRO SEMANAS; EN NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PESEN MENOS DE 50 KG: EL DECREMENTO EN LA DOSIS NO DEBE EXCEDER DE 10 MG/KG DOS VECES AL DÍA CADA DOS SEMANAS). INSUFICIENCIA RENAL O HEPÁTICA: EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL, LA ADMINISTRACIÓN DE LEVETIRACETAM PUEDE REQUERIR AJUSTES DE DOSIS (VER TABLA). EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA HEPÁTICA GRAVE, SE RECOMIENDA VALORAR LA FUNCIÓN RENAL ANTES DE LA SELECCIÓN DE LA DOSIS. DEPRESIÓN Y/O IDEACIÓN SUICIDA: SE HAN REPORTADO CASOS DE SUICIDIO, INTENTO DE SUICIDIO, IDEAS Y COMPORTAMIENTO SUICIDA EN PACIENTES TRATADOS CON AGENTES ANTIEPILÉPTICOS (INCLUYENDO LEVETIRACETAM). EXISTE UN RIESGO LIGERAMENTE MAYOR DE PENSAMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS SUICIDAS. EL MECANISMO DE ESTE RIESGO ES DESCONOCIDO. SE DEBERÁ VIGILAR A LOS PACIENTES PARA DETECTAR SIGNOS DE DEPRESIÓN, IDEAS O COMPORTAMIENTOS SUICIDAS Y SE ESTABLECERÁ UN TRATAMIENTO ADECUADO. SE DEBE ACONSEJAR A LOS PACIENTES (Y A SUS CUIDADORES) QUE BUSQUEN ATENCIÓN MÉDICA SI EMERGEN SIGNOS DE DEPRESIÓN Y/O IDEAS SUICIDAS. POBLACIÓN PEDIÁTRICA: LA FORMULACIÓN EN COMPRIMIDOS NO ESTÁ ADAPTADA PARA SU ADMINISTRACIÓN A LACTANTES Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS. LOS DATOS DISPONIBLES EN NIÑOS NO SUGIEREN UN IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO Y LA PUBERTAD. SIN EMBARGO, LOS EFECTOS A LARGO PLAZO SOBRE EL APRENDIZAJE, INTELIGENCIA, CRECIMIENTO, FUNCIÓN ENDOCRINA, PUBERTAD Y FERTILIDAD EN NIÑOS SIGUEN SIENDO DESCONOCIDOS. FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA. FERTILIDAD: NO HAY DATOS CLÍNICOS DISPONIBLES EN HUMANOS. EL RIESGO POTENCIAL PARA LOS HUMANOS SE DESCONOCE. EMBARAZO: LEVETIRACETAM NO SE RECOMIENDA DURANTE EL EMBARAZO Y EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA QUE PUEDAN TENER HIJOS QUE NO UTILICEN ANTICONCEPTIVOS A MENOS QUE SEA CLARAMENTE NECESARIO. NO HAY DATOS ADECUADOS DEL USO DE LEVETIRA

Contraindicaciones:

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



Hipersensibilidad a levetiracetam, a otros derivados de la pirrolidona o a alguno de los excipientes.

Reacciones Adversas:

Descripcion ATC:

LEVETIRACETAM

Codigo ATC:

N03AX14

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Laboratorio Fabricante:

Mega Labs S.A.

+(031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica