



AMOXIDAL DUO COMPRIMIDOS

AMOXIDAL DUO X 14 COMP 875 MG

Formula:

Cada comprimido recubierto contiene Amoxicilina Trihidrato equivalente a 875 mg de Amoxicilina 1006,2050 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2020M-014496-R3

Fecha vencimiento Invima:

2025-09-09 00:00:00.000000

C_U_M:

19908092-3

Vida Util:

1095

Indicaciones:

Tratamiento de infecciones bacterianas localizadas en vías respiratorias superiores e inferiores, vías gastrointestinales, genitourinarias, piel y tejidos blandos óseos, vías biliares pélvicas y en gonorrea, septicemia, endocarditis, meningitis, peritonitis. Cepas de microorganismos grampositivos aerobios estreptococos, faecalis, estreptococos pneumoniae, pyogenes, viridans. Estafilococos aureus sensibles a las penicilinas, Corynebacteris, Bacillus anthracis y Listeria monocitogenes. Microorganismos gram negativos: aerobios: Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigela, Bordetella, pertusis, brucella, Neisseria gonorrhoeae y meningitidis, Pasterela septica, Vibrión cholera y Helicobacter pylori

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

PRECAUCIONES: TENER PRESENTE LA POSIBILIDAD DE ALERGIA CRUZADA CON LAS CEFALOSPORINAS. EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE LYME PUEDEN SOBREVENIR REACCIONES DE JARISCH-HERXHEIMER. EN TRATAMIENTOS PROLONGADOS SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROLES PERIÓDICOS DE LAS FUNCIONES HEPÁTICA, RENAL Y HEMATOPOYÉTICA. DEBE TENERSE EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE SUPERINFECCIÓN POR OTRAS BACTERIAS U HONGOS RESISTENTES A LA AMOXICILINA. EMBARAZO Y LACTANCIA: EL ANTIBIÓTICO ATRAVIESA LA BARRERA PLACENTARIA Y PASA A LA LECHE MATERNA, CIRCUNSTANCIA QUE DEBE SER TENIDA EN CUENTA CUANDO SE LO ADMINISTRA. ADVERTENCIAS: ES CONVENIENTE INTERROGAR, EN TODOS LOS CASOS, ACERCA DE ANTECEDENTES DE REACCIONES ALÉRGICAS A LOS DERIVADOS PENICILÍNICOS. ANTE ANTECEDENTES DE ALERGIA TÍPICA A ESTOS PRODUCTOS, LA CONTRAINDICACIÓN ES FORMAL. LA APARICIÓN DE CUALQUIER MANIFESTACIÓN ALÉRGICA DURANTE EL TRATAMIENTO IMPONE LA INTERRUPCIÓN DEL MISMO. LAS REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD SEVERAS (ANAFILAXIA) Y A VECES FATALES HAN SIDO EXCEPCIONALMENTE OBSERVADAS EN LOS PACIENTES TRATADOS CON ESTA CLASE DE PENICILINAS. AUNQUE ESTOS ACCIDENTES SEAN MÁS FRECUENTES CON LA ADMINISTRACIÓN PARENTERAL, ELLOS PUEDEN, MUY EXCEPCIONALMENTE, SOBREVENIR DESPUÉS DE LA INGESTIÓN ORAL DE LOS PRODUCTOS. LA ALERGIA CRUZADA ENTRE LAS PENICILINAS Y LAS CEFALOSPORINAS SE PRESENTA EN UN 5 A 10% DE LOS CASOS. ESTO CONDUCE A PROSCRIBIR LAS PENICILINAS CUANDO EL PACIENTE SEA RECONOCIDAMENTE ALÉRGICO A LAS CEFALOSPORINAS. SE HAN INFORMADO CASOS DE COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA CON CASI TODOS LOS FÁRMACOS ANTIBACTERIANOS, INCLUYENDO LA AMOXICILINA, CUYA SEVERIDAD HA SIDO DE LEVE A PELIGROSA PARA LA VIDA. POR LO TANTO ES IMPORTANTE CONSIDERAR ESTAS PRECAUCIONES.

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



QUE PRESENTEN DIARREA SUBSECUENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS ANTIBACTERIANOS.

Contraindicaciones:

NO ADMINISTRARSE A PACIENTES SENSIBLES A LA PENICILINA. PRESTAR ATENCIÓN A LA POSIBLE SENSIBILIDAD CRUZADA CON OTROS ANTIBIÓTICOS BETA-LACTÁMICOS EJ. CEFALOSPORINAS. HIPERSENSIBILIDAD A ESTOS ANTIBIÓTICOS. PACIENTES CON HIPERSENSIBILIDAD SEVERA (ANAFILAXIS) EN OCASIONES A VECES FATALES. LOS EXANTEMAS ERITEMATOSOS (MORBILIFORMES), SE HAN ASOCIADO CON FIEBRE GLANDULAR EN PACIENTES QUE ESTÁN RECIBIENDO AMOXICILINA. SU USO PROLONGADO PUEDE DAR ORIGEN A CRECIMIENTO EXCESIVO DE MICROORGANISMOS NO SUSCEPTIBLES. AJUSTAR LA DOSIS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL, EMBARAZO Y LACTANCIA. LA AMOXICILINA NO ES SUSCEPTIBLE A MICROORGANISMOS QUE PRODUCEN BETA-LACTAMASAS COMO LOS ESTAFILOCOCOS RESISTENTES Y LAS PSEUDOMONAS KLEBSIELLA Y ENTEROBACTER.

Reacciones Adversas:

Reacciones de hipersensibilidad: Erupción eritematosa maculopapular, eritema multiforme, síndrome de Stevens - Johnson, trastornos respiratorios, muy excepcionalmente shock anafiláctico, necrosis tóxica epidérmica. Del aparato digestivo: Náuseas, vómitos, diarrea, candidiasis. Más raramente, elevación moderada y transitoria de las transaminasas. Se han comunicado casos aislados de enterocolitis pseudomembranosa. Hematológicas y linfáticas: Durante el tratamiento con penicilinas se ha informado anemia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, eosinofilia, leucopenia y agranulocitosis, generalmente reversibles y consideradas como un fenómeno de hipersensibilidad. Psiconeurológicas: Raramente, hiperactividad, agitación, ansiedad, insomnio, confusión, cambios en la conducta.

Descripción ATC:

AMOXICILINA

Código ATC:

J01CA04

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Laboratorio Fabricante:

ROEMMERS ARGENTINA S.A.I.C.F.

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica