

DEXLANZOPRAL 60 MG CÁPSULAS

DEXLANZOPRAL 60 MG X 30 Caps

Formula:

Cada capsula contiene DEXLANSOPRAZOL SESQUIHIDRATO 64.37mg Equivalente a DEXLANSOPRAZOL BASE 60mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños

Registro Invima:

INVIMA 2015M-0016359

Fecha vencimiento Invima:

2020-10-29 00:00:00.000000

C U M:

20066787-6

Vida Util:

912

Indicaciones:

TRATAMIENTO TANTO AGUDO COMO DE MANTENIMIENTO DE LA ESOFAGITIS EROSIVA Y EN EL TRATAMIENTO DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO SINTOMÁTICO NO EROSIVO. TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADO PARA TRATAR SÍNTOMAS DE OTRAS ALTERACIONES VINCULADAS CON EL EXCESO DE ACIDEZ GÁSTRICA.

Dosis y Administracion:

SEGúN PRESCRIPCIÓN MEDICA

Precauciones:

FRACTURAS: PUEDEN OCURRIR FRACTURAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL, CADERA O MUÑECAS DURANTE EL TRATAMIENTO CON IBP, EL RIESGO SE INCREMENTA EN PERSONAS MAYORES DE 50 AÑOS, DOSIS ELEVADAS Y/O EL USO PROLONGADO (MÁS DE 1 AÑO). ATAZANAVIR: NO SE RECOMIENDA EL USO CONCOMITANTE CON ATAZANAVIR. HIPOMAGNESEMIA: CON LA ADMINISTRACIÓN PROLONGADA SE HA REPORTADO RIESGO AUMENTADO DE HIPOMAGNESEMIA QUE SE VE INCREMENTADO AÚN MÁS CON LA ASOCIACIÓN DE FÁRMACOS QUE CAUSEN DISMINUCIÓN DE ESTE ION EN SANGRE. SE RECOMIENDA REALIZAR MONITOREO DEL MAGNESIO PLASMÁTICO Y DISCONTINUAR EL TRATAMIENTO CON DEXLANSOPRAZOL SI ES NECESARIO. LA RESPUESTA SINTOMÁTICA A DEXLANSOPRAZOL NO EXCLUYE LA PRESENCIA DE NEOPLASIA GÁSTRICA MALIGNA, POR LO QUE SE RECOMIENDA EXCLUIR DICHO DIAGNÓSTICO PREVIO AL TRATAMIENTO.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad Conocida al Dexlansoprazol, Lansoprazol ó a Cualquiera de los componentes de la Fórmula.

Reacciones Adversas:

-Reacciones anatifacticas: Se han reportado reacciones anafilácticas e incluso shock anafiláctico en la experiencia posterior a la comercialización de Dexland

y la causalidad de Dexlansopuzol no han sido determinadas. -Reacciones de hipersensibilidad: Su incidencia es menor al 2% de los pacientes. Fracturas: Se ha observado un posible, necemento en el riesgo de fracturas de muñeca, cadera y columna vertebral asociados con tratales de muñecas.

+(031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 🥊

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1



pacientes que reciben altas dosis, por un período prolongado y que superan los 50 años de edad. -Síndrome de Stevens-Johnson: Durante la experiencia posterior a la comercialización se ha observado la aparición de Síndrome de Stevens-Johnson, en algunas ocasiones fatal. No se ha establecido la frecuencia ni la relación causal de este efecto. -Se han reportado casos de Necrosis epidérmica tóxica, en algunos fatal, durante la experiencia posterior a la comercialización. No ha sido determinada la frecuencia y la causalidad de Dexlansoprazol. Las reacciones adversas más comúnmente informadas (con una incidencia de más del 2% de los pacientes tratados) fueron: Diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, infección del tracto respiratorio superior, vómitos y flatulencia. Con una frecuencia menor (incidencia menor al 2%) se han reportado las siguientes reacciones adversas: -Cardiovasculares: Ángor, dolor torácico, infarto de miocardio, arritmias cardíacas tanto rápidas como lentas, edema y palpitaciones. - Dermatológicas: Acné, dermatitis, eritema, prurito y erupción. -Endocrinológicas: Bocio. -Gastrointestinales: Alteraciones en la percepción del gusto. -Genitourinarias: Disuria, urgencia miccional, dispareunia, alteraciones menstruales, dismenorrea, menorragia y alteraciones en la libido. -Hematológicas y linfáticas: Anemia y linfadenopatía. - Hepatobiliares: Cólico biliar, hepatomegalia y colelitiasis. -Inmunológicas: Reacciones de hipersensibilidad

Descripcion ATC:

DEXLANSOPRAZOL

Codigo ATC:

A02BC06

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños

Laboratorio Fabricante:

MEGALABS URUGUAY S.A.