



**SINAC®**

**SINAC GEL X 30 G**

### Formula:

Cada 100g de gel contiene: Gel de Clindamicina: Clindamicina Base (Como clindamicina Fosfato) 1.0g, gel de peroxido de Benzoilo 5.0g

### Clasificación

Medicamento

## Almacenamiento

Almacenar a temperatura inferior a 30°C en su envase y empaque original.

### Registro Invima:

INVIMA 2019M-0008870-R1

### Fecha vencimiento Invima:

2024-01-25 00:00:00.000000

### C\_U\_M:

19994185-01

### Vida Util:

730

### Indicaciones:

TRATAMIENTO TÓPICO DEL ACNE

### Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA

### Precauciones:

PARA USO TÓPICO EXTERNO ÚNICAMENTE, NO PARA USO OFTÁLMICO. EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y MEMBRANAS MUCOSAS. EL PERÓXIDO DE BENZOÍLO PUEDE DECOLORAR EL CABELLO, ROPA DE COLOR, TOALLAS Y ALFOMBRAS. CUANDO SE TIENE CONCOMITANTEMENTE OTRO TRATAMIENTO CONTRA EL ACNÉ, ESTA TERAPIA DEBE MANEJARSE CUIDADOSAMENTE, PUESTO QUE SE PODRÍA PRESENTAR UN EFECTO IRRITANTE ACUMULATIVO.

### Contraindicaciones:

HIPERSENSIBILIDAD A CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DE LA FÓRMULA.

### Reacciones Adversas:

Se podría presentar localmente: eritema, exfoliación, sensación de quemadura y resequedad en la zona de aplicación. Los siguientes efectos adversos requieren atención médica: Incidencia poco frecuente: Dermatitis de contacto o hipersensibilidad (Rash cutáneo, picazón, enrojecimiento, inflamación u otros signos de irritación no presentes antes del inicio de la terapia). Rara incidencia: Colitis pseudomembranosa (Calambres abdominales o estomacales, dolor e incremento en el diámetro del área abdominal (inflamación); diarrea acuosa y severa, la cual también puede contener sangre; fiebre; sed aumentada; náuseas o vómito; cansancio o debilidad inusual; pérdida de peso inusual). La Colitis pseudomembranosa se puede presentar después de que la terapia es suspendida y requiere atención médica. Los siguientes efectos adversos necesitan atención médica solamente si persisten o si son demasiado molestos: Incidencia más frecuente: resequedad, piel rugosa o descamación de la piel. Incidencia menos frecuente: Desórdenes gastrointestinales (Dolor abdominal, diarrea suave); irritación, sensibilización o piel grasosa; sensación de calor, picazón o quemadura de la piel.

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica

**Descripción ATC:**

BENZOIL PEROXIDO COMBINACIONES

**Código ATC:**

D10AE51

**Almacenamiento:**

Almacenar a temperatura inferior a 30°C en su envase y empaque original.

**Laboratorio Fabricante:**

Arbofarma S.A.S.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica