



SERTAL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

SERTAL X 20 COMPRIMIDOS

Formula:

Cada comprimido recubierto contiene Propinox clorhidrato (Pargeverina) 10.0 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Registro Invima:

INVIMA 2019M-0001049-R2

Fecha vencimiento Invima:

2024-01-31 00:00:00.000000

C_U_M:

19925381-3

Vida Util:

1095

Indicaciones:

Antiespasmódico

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

PRECAUCIONES: DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE EFECTOS ANTICOLINÉRGICOS (ESPECIALMENTE EN PACIENTES SENSIBLES O CUANDO SE USAN DOSIS ELEVADAS), DEBE EMPLEARSE CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON PREDISPOSICIÓN A LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL O URINARIA, ASÍ COMO EN LA HIPERTROFIA PROSTÁTICA Y GLAUCOMA. LOS MEDICAMENTOS CON ACCIÓN ANTICOLINÉRGICA PUEDEN AUMENTAR LA FRECUENCIA Y LA CONDUCCIÓN CARDÍACA, POR TAL MOTIVO SE RECOMIENDA ADMINISTRARLOS CON PRECAUCIÓN A PACIENTES CON TIROTOXICOSIS, INSUFICIENCIA CARDÍACA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y ESTENOSIS MITRAL. TAMBIÉN PUEDEN RELAJAR EL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR, POR LO CUAL DEBERÍAN EVITARSE EN PACIENTES CON REFLUJO GASTROESOFÁGICO O HERNIA HIATAL. EMBARAZO: NO EXISTE EXPERIENCIA SUFICIENTE CON LA ADMINISTRACIÓN DE PROPINOX A MUJERES EMBARAZADAS. LACTANCIA: SE DESCONOCE SI EL PROPINOX PASA A LECHE MATERNA. LOS ANTICOLINÉRGICOS INHIBEN LA LACTANCIA. POR LO ANTEDICHO, TANTO EN EMBARAZO COMO LACTANCIA LA INDICACIÓN QUEDA SUJETA A LA RELACIÓN RIESGO-BENEFICIO QUE EVALÚE EL MÉDICO TRATANTE. USO GERIÁTRICO: LOS PACIENTES ANCIANOS PUEDEN PRESENTAR UNA MAYOR SENSIBILIDAD A LOS ANTICOLINÉRGICOS. SE RECOMIENDA ADMINISTRARLO CON PRECAUCIÓN POR EL RIESGO DE GLAUCOMA NO DIAGNOSTICADO. ADVERTENCIAS: SE SUSPENDERÁ EL TRATAMIENTO CON SERTAL CONSULTANDO AL MÉDICO, SI SE PRESENTARAN REACCIONES ALÉRGICAS EN LA PIEL Y/O MUCOSAS. LA ADMINISTRACIÓN DE DOSIS ELEVADAS PUEDE PRODUCIR TRASTORNOS DE LA ACOMODACIÓN; POR LO TANTO, SE RECOMIENDA ADMINISTRARLO CON PRECAUCIÓN Y EVITAR LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y LA OPERACIÓN DE MAQUINARIAS PELIGROSAS HASTA LOGRAR LA NORMALIZACIÓN DE LA VISIÓN. EN DOSIS SUPERIORES A LAS HABITUALES TAMBIÉN PUEDE INHIBIR LA SUDORACIÓN CON EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA TEMPERATURA CORPORAL, HECHO QUE DEBE TENERSE EN CUENTA EN PACIENTES CON FIEBRE O EN AMBIENTES CON TEMPERATURA ELEVADA.

Contraindicaciones:

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



Hipersensibilidad reconocida a cualquiera de los componentes.

Reacciones Adversas:

En pacientes particularmente sensibles o con la administración de dosis elevadas, puede aparecer epigastralgia, acidez, náuseas, vómitos, sequedad bucal, constipación, diarrea, visión borrosa, mareos, somnolencia, cefalea, palpitaciones o taquicardia, modificables mediante un ajuste posológico. Más raramente: Alergia cutánea, gastritis, sangrado gastrointestinal, retención urinaria, aumento de la presión intraocular, cansancio, disminución de la memoria.

Descripcion ATC:

PROPINOX CLORHIDRATO

Codigo ATC:

A03AD01

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Laboratorio Fabricante:

Mega Labs S.A.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica