



SERTAL® COMPUESTO COMPRIMIDOS

SERTAL COMP. COMP.RECUB. CAJA X 10

Formula:

Cada tableta contiene Propinox Clorhidrato 10 mg; Clonixinato de Lisina 125 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2008 M-010556 R-1

Fecha vencimiento Invima:

2018-10-30 00:00:00.000000

C_U_M:

226433-4

Vida Util:

1080

Indicaciones:

Medicamento espasmolítico y analgésico destinado al tratamiento sintomático de los síndromes de origen gastrointestinal.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA

Precauciones:

ADVERTENCIAS SE SUSPENDERÁ EL TRATAMIENTO CON SERTAL COMPUESTO CONSULTANDO AL MÉDICO, SI SE PRESENTARAN REACCIONES ALÉRGICAS EN LA PIEL Y/O MUCOSAS O SÍNTOMAS DE ÚLCERA PÉPTICA O DE HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES PUEDEN PRESENTAR TOXICIDAD GASTROINTESTINAL SERIA COMO SER ULCERACIÓN, SANGRADO Y PERFORACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, CON O SIN SÍNTOMAS DE ALERTA PREVIOS. LOS PACIENTES CON ANTECEDENTES DE EVENTOS GASTROINTESTINALES SERIOS, OTROS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON LA ÚLCERA PÉPTICA (ALCOHOLISMO, TABAQUISMO) Y LOS PACIENTES ANCIANOS O DEBILITADOS PRESENTAN UN RIESGO MAYOR. LA ADMINISTRACIÓN DE DOSIS ELEVADAS PUEDE PRODUCIR TRASTORNOS DE LA ACOMODACIÓN; POR LO TANTO, SE RECOMIENDA ADMINISTRARLO CON PRECAUCIÓN Y EVITAR LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y LA OPERACIÓN DE MAQUINARIAS PELIGROSAS HASTA LOGRAR LA NORMALIZACIÓN DE LA VISIÓN. EN DOSIS SUPERIORES A LAS HABITUALES TAMBIÉN PUEDE INHIBIR LA SUDORACIÓN CON EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA TEMPERATURA CORPORAL, HECHO QUE DEBE TENERSE EN CUENTA EN PACIENTES CON FIEBRE O EN AMBIENTES CON TEMPERATURA ELEVADA. PRECAUCIONES DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE EFECTOS ANTICOLINÉRGICOS (ESPECIALMENTE EN PACIENTES SENSIBLES O CUANDO SE USAN DOSIS ELEVADAS), DEBE EMPLEARSE CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON PREDISPOSICIÓN A LA OBSTRUCCIÓN INTESITAL O URINARIA. HIPERTROFIA PROSTÁTICA. GLAUCOMA. LOS MEDICAMENTOS CON ACCIÓN ANTICOLINÉRGICA PUEDEN AUMENTAR LA FRECUENCIA Y LA CONDUCCIÓN CARDÍACA, POR TAL MOTIVO SE RECOMIENDA ADMINISTRARLOS CON PRECAUCIÓN A PACIENTES CON TIROTOXICOSIS, INSUFICIENCIA CARDÍACA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y ESTENOSIS MITRAL. TAMBIÉN PUEDEN RELAJAR EL ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR, POR LO CUAL DEBERÍAN EVITARSE EN PACIENTES CON REFLUJO GASTROESOFÁGICO O HERNIA HIATAL. ADMINISTRARLO CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DIGESTIVOS, DE ÚLCERA PÉPTICA GASTRODUODENAL O GASTRITIS. AUNQUE NO SE HA DESCRIPTO CASO ALGUNO

Contraindicaciones:

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



Embarazo, úlcera péptica activa o hemorragia gastroduodenal, estenosis pilórica orgánica, hipertrofia de próstata y glaucoma. Adminístrese con precaución en pacientes con antecedentes de úlcera péptica gastroduodenal o gastritis. Hipersensibilidad reconocida a cualquiera de los componentes. Úlcera péptica activa o hemorragia gastroduodenal. Antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria ocasionados por la administración de ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroides.

Reacciones Adversas:

En pacientes particularmente sensibles o con la administración de dosis elevadas, puede aparecer epigastralgia, acidez, náuseas, vómitos, sequedad bucal, constipación, diarrea, visión borrosa, mareos, somnolencia, cefalea, palpitaciones o taquicardia, modificables mediante un ajuste posológico. Más raramente: Alergia cutánea, gastritis, sangrado gastrointestinal, retención urinaria, aumento de la presión intraocular, cansancio, disminución de la memoria. Con otros AINEs se han informado además: Edema, retención de líquidos y úlcera gastroduodenal con o sin hemorragia y/o perforación.

Descripción ATC:

ANTIESPASMÓDICOS EN COMBINACIÓN CON ANALGÉSICOS

Código ATC:

A03D

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Laboratorio Fabricante:

MEGALABS URUGUAY S.A.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica