



# DORIXINA RELAX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

DORIXINA RELAX X 20 COMP

## Formula:

Cada tableta cubierta contiene Clonixinato de lisina 125 mg y ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg

## Clasificación

Medicamento

## Almacenamiento

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños

## Registro Invima:

INVIMA 2020M-0000971-R2

## Fecha vencimiento Invima:

2025-12-29 00:00:00.000000

## C\_U\_M:

19908244-3

## Vida Util:

1080

## Indicaciones:

Dolor agudo de origen musculoesquelético cuando se acompaña de contractura muscular.

## Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA

## Precauciones:

PRECAUCIONES PACIENTES CON RETENCIÓN URINARIA Y/O GLAUCOMA DEBE USARSE CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE RETENCIÓN URINARIA, GLAUCOMA DE ÁNGULO CERRADO, AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR Y EN PACIENTES QUE TOMAN MEDICAMENTOS ANTICOLINÉRGICOS. ELEVACIÓN DE LAS TRANSAMINASAS SE HA DESCRITO QUE OCASIONALMENTE DURANTE EL TRATAMIENTO SE PRODUCE UNA ELEVACIÓN DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE LAS TRANSAMINASAS O DE OTROS PARÁMETROS DE LA FUNCIÓN HEPÁTICA. EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS EL AUMENTO SOBRE LOS NIVELES NORMALES ES PEQUEÑO Y TRANSITORIO. ALCOHOL U OTROS DEPRESORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) CICLOBENZAPRINA ESPECIALMENTE CUANDO SE USA CON ALCOHOL U OTROS DEPRESORES DEL SNC, PUEDE AFECTAR LAS CAPACIDADES MENTALES Y/O FÍSICAS REQUERIDAS PARA REALIZAR TAREAS PELIGROSAS, COMO OPERAR MAQUINARIA O CONDUCIR UN VEHÍCULO MOTORIZADO. ADVERTENCIAS NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE PRODUCTO POR MÁS DE 2 SEMANAS. CON LA CICLOBENZAPRINA, SE PUEDEN POTENCIAR LOS EFECTOS DEPRESORES DEL ALCOHOL, BARBITÚRICOS U OTROS DEPRESORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. EVITAR SU USO POR MÁS DE TRES SEMANAS. NO SE ACONSEJA SU USO EN ADULTOS MAYORES. NO CONDUCIR VEHÍCULOS NI MANEJAR MAQUINARIA PESADA.

## Contraindicaciones:

? Hipersensibilidad a alguno de los componentes. ? Hipertiroidismo. ? Fase aguda de recuperación del IAM, arritmias, bloqueos o alteraciones de la conducción, insuficiencia cardíaca congestiva. ? Uso concomitante con inhibidores de la MAO o dentro de los 14 días siguientes a su suspensión. ? Úlcera péptica activa o hemorragia gastroduodenal activa. ? Antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria ocasionados por el ácido acetil salicílico u otros AINEs. ? Postoperatorio de bypass coronario. Embarazo y Lactancia

## Reacciones Adversas:

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



Por contener Clonixinato de lisina Es bien tolerado cuando se administra en dosis terapéuticas. Raramente pueden presentarse náuseas, vómitos, gastritis, somnolencia. En pacientes predispuestos pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad, generalmente cutáneas. Por contener Ciclobenzaprina Los siguientes efectos adversos han sido seleccionados en base a su potencial significado clínico. Efectos adversos que necesitan atención médica. De rara incidencia: Anafilaxia (cambios en la coloración de la piel; rash cutáneo, urticaria y/o prurito; respiración irregular o taquipnea; jadeo o edema de párpados o periorbicular; respiración angustiosa, opresión torácica, angioedema (edema tipo urticariano en cara, párpados, boca, labios y/o lengua); efectos anticolinérgicos (problemas en la micción); toxicidad del SNC (anormalidades en el pensamiento y sueño, torpeza o inestabilidad; confusión severa o desorientación; depresión mental; ojeras; dermatitis alérgica (rash cutáneo, urticaria o prurito); hepatitis, colestasis (ictericia); síncope (desmayo). Nota: Manía también ha sido reportada en algunos pacientes con enfermedad psiquiátrica previa. Efectos adversos que necesitan de atención médica solo si los síntomas son persistentes o de cierta intensidad. Incidencia más frecuente: Efectos anticolinérgicos sequedad de boca (7 a 27%) visión borrosa (<3%); vértigo o escotomas (3 a 11%); somnolencia (16 a 39%). Nota: vértigo, escotomas y somnolencia pueden ser causadas por los efectos anticolinérgicos de la droga y también por los efectos sobre el SNC. Incidencia menos frecuente o rara (<3%): Efectos sobre el SNC (cefalea; confusión; excitación o nerviosismo; sentimiento de discomfort o enfermedad; entumecimiento; estremecimiento, dolor o debilidad en manos y pies; temblores musculares; temblores; dificultad en el sueño; cansancio inusual; constipación; micción frecuente, irritación gastrointestinal, cólicos gástricos); sensación de abotagamiento o meteorismo; diar

## Descripción ATC:

OTROS ANTIINFLAMATORIOS / AGENTES ANTIRREUMÁTICOS EN COMBINACIÓN CON OTROS FÁRMACOS

## Código ATC:

M01BX

## Almacenamiento:

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Manténgase fuera del alcance de los niños

## Laboratorio Fabricante:

MEGALABS URUGUAY S.A.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica