



BETARRETIN 0.025% GEL X 30 G.

BETARRETIN 0.025% GEL X 30 G.

Formula:

Cada 100 g de gel contiene: Ácido Retinoico (Treinoína) 0,025 g

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Registro Invima:

INVIMA 2022M-012287-R4

Fecha vencimiento Invima:

2027-12-12 00:00:00.000000

C_U_M:

38863-1

Vida Util:

1095

Indicaciones:

Tratamiento del acné vulgar.

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

EVITAR EXPOSICIÓN AL SOL. DEBERÁ USARSE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA, COMO PARTE DE UN PROGRAMA COMPLETO DE CUIDADO DE LA PIEL, INCLUYENDO EDUCACIÓN RESPECTO A EVITAR EL SOL Y AL CUIDADO GENERAL DE LA PIEL, EMPLEANDO FILTROS SOLARES, PRODUCTOS HIDRATANTES Y ROPAS PROTECTORAS. EVITAR CONTACTO CON LOS PÁRPADOS, ÁNGULOS DE LA NARIZ BOCA Y MEMBRANAS MUCOSAS U OTRAS ZONAS DONDE EL TRATAMIENTO NO ESTÁ INDICADO, PARA MINIMIZAR LA POTENCIAL IRRITACIÓN CUTÁNEA ADICIONAL. DEBERÁ TOMARSE PRECAUCIÓN PARA NO DEJAR MEDICACIÓN ACUMULADA EN LOS PLIEGUES DE LA PIEL, EN LAS ZONAS DE LA PIEL MÁS SENSIBLES. EVITAR EL LAVADO FRECUENTE DE LA CARA: DOS O TRES VECES AL DÍA, USANDO UN JABÓN NEUTRO Y PROCURANDO SECAR SIN FROTAR. NO SE APLICARÁ HASTA MEDIA HORA DESPUÉS DE HABER LAVADO LA CARA. IRRITACIÓN LOCAL: DISMINUYE AL ESPACIAR LAS DOSIS. DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS SE PUEDE PRESENTAR ENCRUCECIMIENTO DE LA AFECCIÓN, PROCESO ESPERADO EN LA ELIMINACIÓN DE MICROQUISTES EN FORMACIÓN. EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR: EVITAR O REDUCIR LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR, INCLUIDAS LAS LÁMPARAS SOLARES ULTRAVIOLETAS (IVB), DURANTE EL TRATAMIENTO. LOS PACIENTES CON QUEMADURAS SOLARES NO DEBEN EMPLEAR EL PRODUCTO HASTA SU RECUPERACIÓN TOTAL, POR LA POTENCIAL IRRITACIÓN GRAVE QUE PUEDE PRODUCIR. EL PACIENTE QUE EXPERIMENTE EXPOSICIONES SOLARES CONSIDERABLES DEBIDO A LAS TAREAS OCUPACIONALES Y/O CUALQUIER OTRA PERSONA INHERENTEMENTE SENSIBLE AL SOL, DEBERÁ TOMAR PRECAUCIONES ESPECIALES. CUANDO NO PUEDE EVITARSE LA EXPOSICIÓN AL SOL, SE RECOMIENDA EMPLEAR PRODUCTOS CON FILTROS SOLARES Y ROPAS PROTECTORAS SOBRE LAS ZONAS TRATADAS.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al medicamento, dermatitis aguda, eczema agudo, rosácea, no debe usarse en quemaduras, cerca de los ojos y de la boca. Embarazo. Antecedentes de epiteloma cutáneo.

+57 (031) 6461700
Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia
Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



Reacciones Adversas:

.

Descripcion ATC:

TETRINOINA

Codigo ATC:

D10AD01

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C

Laboratorio Fabricante:

Altea Farmaceutica S.A

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica