

ENDIAL

ENDIAL 1 MG X 20 COMP

To.			1	۱_	
\mathbf{r}	OI.	ш	w	a	ē

Cada comprimido contiene Cinitaprida (como tartrato ácido) 1 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2020M-0004393-R2

Fecha vencimiento Invima:

2025-08-27 00:00:00.000000

C U M:

19930835-10

Vida Util:

1095

Indicaciones:

 ${\tt COADYUVANTE~EN~EL~MANEJO~DE~ALTERACIONES~DE~LA~MOTILIDAD~GASTROINTESTINAL~EN~LAS~QUE~SE~DEBA~FAVORECER~EL~VACIAMIENTO~GÁSTRICO}$

Dosis y Administracion:

SEGúN PRESCRIPCIÓN MEDICA

Precauciones:

SE RECOMIENDA ADMINISTRAR CON PRECAUCIÓN A PACIENTES QUE CONSUMAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS O MEDICAMENTOS CON ACCIÓN DEPRESORA EN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. LOS COMPRIMIDOS CONTIENEN LACTOSA. SE HAN DESCRITO CASOS DE INTOLERANCIA A ESTE COMPONENTE. AUNQUE LA CANTIDAD PRESENTE EN EL PREPARADO NO ES, PROBABLEMENTE, SUFICIENTE PARA DESENCADENAR SÍNTOMAS E INTOLERANCIA, ANTE LA APARICIÓN DE DIARREA SE DEBE CONSULTAR AL MÉDICO.

Contraindicaciones:

EMBARAZO. ARRITMIAS CARDIACAS, ENFERMEDAD CORONARIA, INSUFICIENCIA CARDIACA; INSUFICIENCIA RENAL; DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO. NO DEBE ADMINISTRARSE CONCOMITANTEMENTE CON ANTICOLINÉRGICOS, ANTIBIÓTICOS MACRÓLIDOS, QUINOLONAS, ANTIMICÓTICOS AZOLICOS, ANTIRRETROVIRALES INHIBIDORES DE PROTEASA, ANTIPSICOTICOS FENOTIAZIMICOS, ANTIARRÍTMICOS CLASE IA Y III, ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS Y OTROS COMO NEFAZODONA, FLUOXETINA Y MAPROTILINA, DIURÉTICO PERDEDORES DE POTASIO.-ANTES DE ADMINISTRAR CINITAPRIDE DEBE REALIZARSE EKG. EL USO DEL MEDICAMENTO EN CASOS CRÓNICOS REQUIERE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PERIÓDICA. USO PARA ESPECIALISTA.

Reacciones Adversas:



		•		
	PCCLI	ncion	ATC:	
$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	COCII	peron	1110.	

CINITAPRIDA

Codigo ATC:

A03FA08

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura inferior a $30^{\circ}\mathrm{C}$.

Laboratorio Fabricante:

MegaLabs S.A.