



AMOXIDAL® DUO SUSPENSION 750 MG

AMOXIDAL DUO SUSP. 750 MG X 70 ML

Formula:

Cada 100 g de polvo para reconstituir a suspensión oral contienen Amoxicilina Trihidrato equivalente a Amoxicilina Base 15 g

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2020M-014711-R3

Fecha vencimiento Invima:

2025-10-07 00:00:00.000000

C_U_M:

19908091-3

Vida Util:

912

Indicaciones:

Tratamiento de las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Precauciones:

PRECAUCIONES: TENER PRESENTE LA POSIBILIDAD DE ALERGIA CRUZADA CON LAS CEFALOSPORINAS. EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE LYME PUEDEN SOBREVENIR REACCIONES DE JARISCH-HERXHEIMER. EN LOS CASOS DE INSUFICIENCIA RENAL DEBE AJUSTARSE LA DOSIS DE ACUERDO AL CLEARANCE DE CREATININA, ESPECIALMENTE CUANDO ESTE ES ≤ 10 ML/MINUTO, O DE LA CREATININEMIA DEL ENFERMO (VER POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN). EN TRATAMIENTOS PROLONGADOS SE RECOMIENDA REALIZAR CONTROLES PERIÓDICOS DE LAS FUNCIONES HEPÁTICA, RENAL Y HEMATOPOYÉTICA. DEBE TENERSE EN CUENTA LA POSIBILIDAD DE SUPERINFECCIÓN POR OTRAS BACTERIAS Y HONGOS RESISTENTES A LA AMOXICILINA. EMBARAZO Y LACTANCIA: EL ANTIBIÓTICO ATRAVIESA LA BARRERA PLACENTARIA Y PASA A LA LECHE MATERNA, CIRCUNSTANCIA QUE DEBE SER TENIDA EN CUENTA CUANDO SE LO ADMINISTRA. ADVERTENCIAS: ES CONVENIENTE INTERROGAR, EN TODOS LOS CASOS, ACERCA DE ANTECEDENTES DE REACCIONES ALÉRGICAS A LOS DERIVADOS PENICILÍNICOS. ANTE ANTECEDENTES DE ALERGIA TÍPICA A ESTOS PRODUCTOS, LA CONTRAINDICACIÓN ES FORMAL. LA APARICIÓN DE CUALQUIER MANIFESTACIÓN ALÉRGICA DURANTE EL TRATAMIENTO IMPONE LA INTERRUPCIÓN DEL MISMO. LAS REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD SEVERAS (ANAFILAXIA) Y A VECES FATALES HAN SIDO EXCEPCIONALMENTE OBSERVADAS EN LOS PACIENTES TRATADOS CON ESTA CLASE DE PENICILINAS. AUNQUE ESTOS ACCIDENTES SEAN MÁS FRECUENTES CON LA ADMINISTRACIÓN PARENTERAL, ELLOS PUEDEN, MUY EXCEPCIONALMENTE, SOBREVENIR DESPUÉS DE LA INGESTIÓN ORAL DE LOS PRODUCTOS. LA ALERGIA CRUZADA ENTRE LAS PENICILINAS Y LAS CEFALOSPORINAS SE PRESENTA EN UN 5 A 10% DE LOS CASOS. ESTO CONDUCE A PROSCRIBIR LAS PENICILINAS CUANDO EL PACIENTE SEA RECONOCIDAMENTE ALÉRGICO A LAS CEFALOSPORINAS. SE HAN INFORMADO CASOS DE COLITIS PSEUDOMEMBRANOSA CON CASI TODOS LOS FÁRMACOS ANTIBACTERIANOS, INCLUYENDO LA AMOXICILINA, CUYA SEVERIDAD HA SIDO DE LEVE A PELIGROSA PARA LA VIDA. POR LO TANTO ES IMPORTANTE CONSIDERAR ESTE DIAGNÓSTICO EN PACIENTES QUE PRESENTEN DIARREA SUBSECUENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS ANTIBACTERIANOS.

Contraindicaciones:

+ (031) 6461700

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica



En individuos con antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas; infecciones por herpes virus, mononucleosis infecciosa, pacientes tratados con allopurinol (aumentan las posibilidades de reacciones alérgicas cutáneas).

Reacciones Adversas:

Reacciones de hipersensibilidad: Erupción eritematosa maculopapular, eritema multiforme, síndrome de Stevens - Johnson, trastornos respiratorios, muy excepcionalmente shock anafiláctico, necrosis tóxica epidérmica. Del aparato digestivo: Náuseas, vómitos, diarrea, candidiasis. Más raramente, elevación moderada y transitoria de las transaminasas. Se han comunicado casos aislados de enterocolitis pseudomembranosa. Hematológicas y linfáticas: Durante el tratamiento con penicilinas se ha informado anemia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, eosinofilia, leucopenia y agranulocitosis, generalmente reversibles y consideradas como un fenómeno de hipersensibilidad. Psiconeurológicas: Raramente, hiperactividad, agitación, ansiedad, insomnio, confusión, cambios en la conducta.

Descripción ATC:

AMOXICILINA

Código ATC:

J01CA04

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a temperatura inferior a 30°C.

Laboratorio Fabricante:

ROEMMERS ARGENTINA S.A.I.C.F.

+ (031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica