

ONDAX® TABLETAS RECUBIERTAS 4 MG

ONDAX 4 MG CAJA X 10 TAB

Formula:

Cada tableta recubierta contiene Ondasetron Clorhidrato Dihidrato 5.0 mg equivalente a Ondasetron base 4.0 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2017M-004936 - R2

Fecha vencimiento Invima:

2022-09-26 00:00:00.000000

C U M:

200366-01

Vida Util:

730

Indicaciones:

NTIEMETICO UTIL EN EL TRATAMIENTO DE LAS NAUSEAS Y EL VOMITO INDUCIDO POR QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA ANTICANCEROSA

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCION MEDICA

Precauciones:

INCREMENTO DEL RIESGO DE ALTERACIÓN DEL INTERVALO QT DEL ECG (ELECTROCARDIOGRAMA), Y CONSECUENTE ARRITMIA VENTRICULAR, POTENCIALMENTE FATAL, ESPECIALMENTE CON LA DOSIS DE 32MG (DOSIS DE 16 MG HASTA 32MG). INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PACIENTES: NO DEJE DE TOMAR ONDANSETRON SIN CONSULTAR CON SU PROFESIONAL DE LA SALUD. DISCUTIR CUALQUIER PREGUNTA O PREOCUPACIÓN ACERCA DE ONDANSETRON CON SU PROFESIONAL DE LA SALUD. AL TIEMPO QUE TOMA ONDANSETRON, SU MÉDICO EN OCASIONES PUEDE ORDENAR UN ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) PARA CONTROLAR EL RITMO CARDÍACO. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA SI EXPERIMENTA UN RITMO CARDÍACO IRREGULAR, FALTA DE ALIENTO, MAREO O DESMAYO MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ONDANSETRON. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD: CAMBIOS EN EL ECG COMO LA PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT SE HAN OBSERVADO EN PACIENTES TRATADOS CON ONDANSETRON, ADEMÁS TORSADE DE POINTES Y UN RITMO CARDÍACO ANORMAL. EL USO DE ONDANSETRON DEBE EVITARSE EN PACIENTES CON SÍNDROME CONGÉNITO DE QT LARGO. LA MONITORIZACIÓN DEL ECG SE RECOMIENDA EN PACIENTES CON ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS (POR EJEMPLO, HIPOPOTASEMIA O HIPOMAGNESEMIA), INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA, BRADIARRITMIAS, O PACIENTES QUE TOMAN MEDICAMENTOS CONCOMITANTES QUE PROLONGUEN EL INTERVALO QT. ACONSEJAR A LOS PACIENTES PONERSE EN CONTACTO CON UN PROFESIONAL MÉDICO DE INMEDIATO SI PRESENTAN SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA FRECUENCIA CARDÍACA O RITMO ANORMAL.

Contraindicaciones:

HIPERSENSIBILIDAD A LOS COMPONENTES EMBARAZO Y LACTANCIA.

Reacciones Adversas:

+(031) 6461700 Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1



T .	•	
LOCOPI	naian	A ' I ' ' •
Descri		
	P	

ONDANSETRON

Codigo ATC:

A04AA01

Almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperatura inferior a $30^{\circ}\mathrm{C}$.

Laboratorio Fabricante:

Blisteco S.A