



GLAUCOPROST SOLUCION OFTALMICA

GLAUCOPROST 3 ML

Formula:

Cada 100ml de solucion contiene: TRAVOPROST 4 mg

Clasificación

Medicamento

Almacenamiento

Almacenar a temperatura inferior a 30°C.

Registro Invima:

INVIMA 2015M-0004063-R1

Fecha vencimiento Invima:

2020-09-11 00:00:00.000000

C_U_M:

19950508-01

Vida Util:

730

Indicaciones:

GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO

Dosis y Administracion:

SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA.

Precauciones:

SE HA COMUNICADO QUE TRAVOPROST PROVOCA CAMBIOS EN LOS TEJIDOS PIGMENTADOS. LOS CAMBIOS INFORMADOS CON MOYOR FRECUENCIA HAN SIDO: O AUMENTO EN LA PIGMENTACIÓN DEL IRIS Y DEL PÁRPADO O AUMENTO EN LA PIGMENTACIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS PESTAÑAS. TRAVOPROST PUEDE PRODUCIR UN CAMBIO GRADUAL DEL COLOR DEL IRIS AUMENTANDO LA CANTIDAD DE PIGMENTO MARRÓN DEL IRIS, INCREMENTANDO LA CANTIDAD DE MELANOCITOS (GRÁNULOS DE PIGMENTO) EN LOS MELANOCITOS. ESTE EFECTO SE OBSERVO MÁS FRECUENTEMENTE EN PACIENTES CON IRIS DE COLOR MIXTO, POR EJEMPLO: AZUL-MARRÓN, GRIS-MARRÓN, VERDE-MARRÓN O AMARILLO-MARRÓN, NO OBSTANTE TAMBIÉN FUE OBSERVADO EN IRIS MARRONES. ESTE CAMBIO SE DEBE A UN AUMENTO EN EL CONTENIDO DE MELANINA EN LOS MELANOCITOS DEL ENDOTELIO DEL IRIS. LOS EFECTOS A LARGO PLAZO SOBRE LOS MELANOCITOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LESIÓN POTENCIAL AL MELANOCITO Y/O UNA DEPOSICIÓN DE GRÁNULOS DE PIGMENTO EN OTRAS ÁREAS OCULARES, SE DESCONOCEN ACTUALMENTE. EL CAMBIO EN EL COLOR DEL IRIS OCURRE LENTAMENTE Y PUEDE NO SER PERCIBIDO POR VARIOS MESES O AÑOS. ANTES DE INSTITUIR EL TRATAMIENTO CON GLAUCOPROST[®] LOS PACIENTES DEBEN SER INFORMADOS DE LA POSIBILIDAD DE UN CAMBIO DE COLOR DEL IRIS. SE INFORMARON CASOS DE OSCURECIMIENTO DE LA PIEL DE LA ZONA PALPEBRAL ASOCIADO AL USO DE TRAVOPROST. TRAVOPROST PUEDE CAUSAR UN CAMBIO GRADUAL DE LAS PESTAÑAS EN SU LARGO, GROSOR, PIGMENTACIÓN Y/O CANTIDAD DE LAS MISMAS. EL TRATAMIENTO UNILATERAL PUEDE RESULTAR EN UNA HETEROCROMÍA PERMANENTE (CAMBIO DE COLOR DEL IRIS, TEJIDO PERIORBITARIO Y PESTAÑAS EN UN OJO RESPECTO AL OTRO) Y EN UNA POTENCIAL DISPARIDAD EN EL LARGO, GROSOR Y NÚMERO DE PESTAÑAS ENTRE LOS OJOS.

Contraindicaciones:

HIPERSENSIBILIDAD CONOCIDA A ALGUNO DE LOS COMPONENTES DE GLAUCOPROST[®]. TRAVOPROST PUEDE SER ALEATORIO POR LO QUE DEBE SER UTILIZADO EN MUJERES EMBARAZADAS O CON PRESUNCIÓN DE EMBARAZO.

+57 (031) 6461700
Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia
Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1

La Compañía Global de Latinoamérica

**Reacciones Adversas:**

.

Descripcion ATC:

TRAVOPROST

Codigo ATC:

S01EE04

Almacenamiento:

Almacenar a temperatura inferior a 30°C.

Laboratorio Fabricante:

LABORATORIOS POEN S.A.U.

+(031) 6461700 

Calle 106 # 18 a - 45. Bogotá, Colombia 

Megalabs Colombia S.A.S. Nit. 800.133.807-1 

La Compañía Global de Latinoamérica